

Faculté de Médecine de Paris

Année 1956

856 N°

T H E S E

pour le

DOCTORAT en MEDECINE
(diplôme d'Etat)

par

Claire LE TREIS

Née le 22 Décembre 1929 à Valenciennes (Nord)

Présentée et soutenue publiquement le

1956

HYPERPLASIE CONGENITALE DES GLANDES CORTICO-SURRENALES

Syndrôme de DEBRE-FIBIGER

- Président : Monsieur le Professeur Robert DEBRE.

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Nom du Candidat :

Prénoms :

Nom de Jeune Fille:

Date de Soutenance :

Numéro d'ordre:

LE TREIS Claire -Hélène

Hyperplasie congénitale
des glandes cortico-
surrénales. Syndrôme
de DEBRE-FIBIGER
Paris 1956 - 83p.

N°)

LE TREIS Claire- Hélène

Hyperplasie congénitale
des glandes cortico-su
rurrénales. Syndrôme
de DEBRE-FIBIGER.
Paris 1956 - 83p.

N°)

LES TREIS Claire- Hélène

Hyperplasie congénitale
des glandes cortico-
surrénales. Syndrôme
de DEBRE-FIBIGER.

Paris- 1956- 83p.
N°)

LE TREIS Claire- Hélène

Hyperplasie congénitale
des glandes cortico-
surrénales. Syndrôme
de DEBRE-FIBIGER.

Paris- 1956- 83p.
N°)

UNIVERSITÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Nom du candidat :

Prénoms :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Image d'identité :

Digitized by the Internet Archive
in 2026

LE THÈME CLASSE - MÉDECINE
Hypertension congénitale
des glandes cortico-
suprénalaires. Syndrome
de PHENYL-ALANINE.
Paris 1956 - 83p.

N°

LE THÈME CLASSE - MÉDECINE
Hypertension congénitale
des glandes cortico-
suprénalaires. Syndrome
de PHENYL-ALANINE.
Paris 1956 - 83p.

N°

LE THÈME CLASSE - MÉDECINE
Hypertension congénitale
des glandes cortico-
suprénalaires. Syndrome
de PHENYL-ALANINE.
Paris 1956 - 83p.

Paris - 1956 - 83p.

LE THÈME CLASSE - MÉDECINE
Hypertension congénitale
des glandes cortico-
suprénalaires. Syndrome
de PHENYL-ALANINE.
Paris 1956 - 83p.

Paris - 1956 - 83p.

Faculté de Médecine de Paris

Année 19 56

N°

T H E S E

pour le

DOCTORAT en MEDECINE
(diplôme d'Etat)

par

Claire LE TREIS

Née le 22 Décembre 1929 à Valenciennes (Nord)

Présentée et soutenue publiquement le

1956

HYPERPLASIE CONGENITALE DES GLANDES CORTICO-SURRENALES

Syndrôme de DEBRE-FIBIGER

président : Monsieur le Professeur Robert DEBRE.



A mes parents,

en témoignage de ma profonde affection

A tous mes amis.

A Monsieur le Professeur Robert DEBRE

Membre de l'Académie de Médecine
Professeur de clinique médicale infantile de la
Faculté de Médecine de Paris.
Grand officier de la légion d'honneur
Médecin des Hôpitaux.

En reconnaissance de l'enseignement
remarquable que nous avons reçu à
l'Hôpital des Enfants Malades, et du
grand honneur qu'il nous a fait en
acceptant de présider cette thèse.

A Monsieur le Professeur H. BRISSAUD

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris
Médecin des Hôpitaux

En reconnaissance de l'excellente
formation médicale que nous avons
reçue dans son service.

A Monsieur le Professeur MOZZICONACCI

Professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris
Médecin des Hôpitaux

Qui a bien voulu nous donner le sujet
de cette thèse, en reconnaissance de
ses précieux conseils.

Au Docteur Henriette MOUFFLARD

Chef de clinique médicale infantile de la Faculté de
Médecine de Paris

Que nous remercions très sincèrement
de nous avoir judicieusement conseillée.

A Monsieur le Docteur DURAND

Médecin-Chef du service de Médecine de l'hôpital
de Pontoise
Assistant des hôpitaux de Paris
Ancien Chef de clinique médicale infantile de la
Faculté de Médecine de Paris

En remerciements des précieuses
connaissances que son enseignement
bienveillant nous a permis d'acquérir
durant notre internat.

A tous nos maîtres d'internat de l'Hôpital de Pontoise,

Au Docteur DASSENCOURT

Médecin à l'Hôpital de Pontoise
Ancien Interne de l'Hôpital Saint-Joseph de Paris

Au Docteur BREITEL

Médecin-Légiste de l'arrondissement
Médecin de l'Hôpital de Pontoise

Au Docteur WILBERT

Oto-rhino-laryngologiste de l'hôpital
Ex-laryngologiste assistant de l'Hôpital Hérold

Au Docteur ROSSANO

Ophthalmologiste de l'Hôpital.

Le 1.10.55

DOYEN HONORAIRE
M. Baudouin,

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. Baudoin, Bernard (4), Bédant, Bédant, Carnot, Charvet, Cluyp, Chevassu, Deibet, Doussiot, Gastinel, Guillaume H. Pheau, Jorier, Laroche, Laubry, Lemaitre, Lenoire, Lory-Sol, Monette, Laroche, Seguy, Laroche, Mathieu, Mocquot, Mondor, Pilon, Olivier (3), Ombredanne, Sannié, Sézary, Tanon.

I. — PROFESSORS.

Anatomie.....	Cardier (G.)
Anatomie pathologique.....	Delacue (A.)
Bactériologie.....	N.
Biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports.....	Guilley-Bert (J.)
Biologie médicale.....	Verne (J.)
Cancérologie médicale et sociale.....	N....
Carcinologie.....	Oberling (C.)
Chimie médicale.....	Py (P.)
	(Hôtel-Dieu..... Brocq (P.)
Cliniques chirurgicales....	(Broussais..... De Gaudart-d'Allaines (E.)
	(Calpétrie..... W.
	(Cochin..... Quénu (J.)
Clinique chirurgicale réformatrice et orthopédique.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique de cardiologie.....	Moupin (M.)
Clinique de chirurgie ORL et des voies respiratoires.....	Pierre (E.)
Clinique de chirurgie des yeux.....	Monod (E.)
Clinique de la tuberculose.....	Bernard (J.)
Clinique de neurologie.....	Petit-Dut (J.)
Clinique de pédiatrie.....	Delmas (J.)
Clinique des maladies de la peau et des maladies vénériennes.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des femmes.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des enfants.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des muscles.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des articulations.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des yeux.....	Monod (E.)
Clinique des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.....	Pierre (E.)
Clinique des maladies des dents.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des os.....	Merle d'Aubigné (A.)
Clinique des maladies des reins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des urines.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des intestins.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des poumons.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des bronches.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des vaisseaux.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des nerfs.....	Reynaud (C.)
Clinique des maladies des	

	MM.		
	(A.)	Stomatologie.....	(Ducourt (A.)) (G.)
	(F.)		
Pathologie chirurgicale	(Baumann (J.)) (Gosset (J.)) (Laurence (G.))	Urologie.....	(R.)

PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES
CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE.

	MM.		
	(Ameline (A.)) (Huguier (J.)) (Léger (L.)) (Padovani (P.)) (Patel (J.)) (Roux (M.)) (Sicard (A.))	Clinique chirurgicale.....	
	(Brouet (G.)) (N.)	Clinique obstétricale...	
Clinique médicale.....	(Decourt (J.)) (Dreyfus (Gil.)) (Fauvert (R.))	Clinique ophtalmologique	(G.) (G.)
		Clinique urologique...	(G.)

Secrétaire général de la Faculté..... M. Morel (J.)
Secrétaire..... Melle Chaintreuil (G.)

Conservateur..... M. le Docteur (A.)
Conservateur..... Melle Goichon

Bibliothécaires.....
(Melles Dumaitre (P.))
(Laurent (H.))
(Le Noir (G.))
(G.)

Trois observations du syndrome de DEBRE-FIDIGER

Maladie caractérisée par une insuffisance cortico-surrénale, associée à une suractivité de la sécrétion des hormones androgènes, produisant des symptômes masculins, qui chez la fille est habituellement associée à une virilisation précoce.

Malgré l'existence d'une anomalie de la régulation électrolytique semblable à celle qu'on voit dans l'insuffisance surrénale.

Les manifestations cliniques surrénaliennes sont de deux ordres : masculines de la vie et de l'adulte, et de l'enfance.

C'est à cette forme que l'on donne le nom de syndrome de Debre-Fidiger.

Actuellement, notre connaissance de cette malformation a permis de trouver le même trouble à l'origine de ces deux syndromes.

Un diagnostic précis est possible grâce au dosage et à l'étude des 17 cétostéroïdes urinaires.

Un traitement efficace est possible depuis que l'on sait le pouvoir anti-androgénique de la cortisone et l'action de la D.O.C.A, de la cortisone et du sel sur les insuffisances surrénales.

Dans cette thèse quatre observations d'enfants atteints de syndrome de Debré-Fibiger traités à l'hôpital des Enfants Malades seront présentées.

A ce propos, une étude d'ensemble sera faite de l'hyperplasie congénitale des glandes cortico-surrénales et plus spécialement du syndrome de Debré-Fibiger.

BIBLIOGRAPHIE

De nombreux cas de syndrome de Debré-Fibiger ont déjà été rapportés dans la littérature médicale.

Le premier cas fut décrit en 1905 par Fibiger :

Il s'agissait d'un enfant de 4 ans, issu d'un état civil comme garçon et hospitalisé à l'âge de 3 ans pour des troubles digestifs, vomissements, gastro-entérite. Il avait pour le moment, un état dystrophique et déséquilibré. Il avait dans ses antécédents qui suivent l'admission, l'examen montre l'absence de menstrues, la présence d'une pénis est normale. L'autopsie confirme l'absence de testicules et montre un utérus avec trompes et ovaires; de grosses artères aortiques; la partie supérieure des reins, elles ont un aspect sclérotique. L'étude histologique n'a pu être faite.

En 1931, Borge et Semelaigne :

décrivent le cas d'un enfant de dix ans, issu d'un état civil comme garçon, Malades parce qu'il n'avait pas pris de poids depuis sa naissance. A son entrée, il pèse 3,300, mesure de 39. Son aspect est celui d'un grand atrophique. L'examen viscéral est normal. Le jour même, dans la soirée, sa température s'élève à 39° et l'enfant meurt dans la nuit. Ses antécédents étaient strictement normaux.

A l'autopsie, les capsules surrénales sont augmentées de volume; elles pèsent chacune 15 gr, soit 4 fois plus que les surrénales normales à cet âge.

A l'examen histologique, les coupes montrent une hyperplasie de la couche corticale. La couche fasciculée est très augmentée et formée principalement de cellules spongiocytaires. Cependant on ne voit aucune anomalie cellulaire et les travées sont normales.

En 1932, Borge et Semelaigne :

signalent des cas de syndromes identiques. Dans le premier cas, un garçon, le quatrième de la famille est hospitalisé à l'âge de trois semaines, pour vomissements qui ont débuté

neuf jours après la naissance. Le diagnostic de syndrome de Turner est établi devant un examen biologique négatif. L'enfant avait perdu 400 gr sur son poids de naissance.

L'autopsie montre des surrénales volumineuses et des foyers dans les fosses lombaires.

L'interrogatoire apprend que trois enfants sont nés au bas âge dans des conditions analogues.

En 1939, Butler et Ross Talbot

étudient les troubles biologiques du syndrome de Robert-Francis. Ils constatent l'hyponatémie, l'hyperkaliémie, l'augmentation des oestrogènes et androgènes, du sodium et des chlorures urinaires.

En 1940, Behr et Dijkhuizen

rapportent le cas de deux frères qui meurent en bas âge, dans un tableau d'insuffisance surrénale.

Chez l'un d'eux, l'autopsie est faite et montre l'absence de zone glomérulaire distincte. Dans les couches les plus externes du cortex, on trouve des colonnes cellulaires: les cellules sont bourrées de lipoides, elles sont de deux types :

- grosses cellules rouges pourpres à noyaux ronds
- très grandes cellules à protoplasme pourpre et noyaux ovales, parfois multiples ou bourgeonnants.

En 1941, Farthouat

décrit trois cas de ce syndrome, dans une même fratrie. Deux garçons de huit semaines, une fille de douze semaines. Une cousine au troisième degré présentait à 28 jours, outre des vésicules en foyers, une gynécose et une polyostéolyse alors que le cœur était normal et qu'il n'y avait pas d'olive pylorique. Le clitoris était péniforme, il n'y avait pas de vagin. Utérus, trompes et ovaires étaient très petits. On trouve une ébauche de prostate.

L'histologie montre des surrénales adénomateuses et des testicules adénomateux.

En 1944, Zellinger

décrit le cas d'un enfant traité par sérum salé et pericortène, l'hypofonctionnement minéralo-corticoïde.

En 1946, Cathala et Alison

rapportent le cas d'un enfant traité par sérum salé et pericortène, l'hypofonctionnement minéralo-corticoïde.

traitement.

A l'autopsie, les surrénales sont augmentées de volume, cérébriformes, pèsent 10 gr chacune, possèdent trois couches bien différenciées, de grosses cellules claires qui leur donnent un aspect spongiocytaire. Les organes génitaux internes sont normaux.

En 1948, Allibone, Baar et Cant

étudient 5 cas de pseudo-hermaphrodisme féminin qui meurent d'insuffisance surrénale.

5 cas d'hyperplasie surrénale chez des garçons atteints de macro-génito-somie précoce et d'insuffisance minéralo-corticoïde.

Ils notent la déperdition chlorée urinaire normale malgré les vomissements et l'ossification prématurée du carpe.

En 1950, N.E France et Catherine

descrivent un cas de pseudo-hermaphrodisme se présentant comme un garçon hypospade avec troubles digestifs graves, rapportés à une insuffisance surrénale.

Un traitement par sel et extraits cortico-surrénaux est institué. Il amène une amélioration certaine.

L'arrêt du sel fait reprendre les troubles. Les modifications électro-lytiques sont importantes et l'hyperkaliémie entraîne des troubles cardiaques.

L'autopsie montre des organes génitaux féminins, des surrénales augmentées de volume, et une zone glomérulaire très mince.

En 1952, Julien Marie,

étudie le cas d'un garçon d'un mois amené pour vomissements et déshydratation ayant débutés une semaine auparavant.

Malgré le traitement l'enfant meurt.. Une étude anatomopathologique détaillée est faite; nous la rapporterons plus loin.

En 1950, Wilkins

fait parître son livre : "The diagnosis and treatment of endocrine disorders in childhood and adolescence" où un chapitre est consacré aux syndrômes surrénaux et à l'hyperplasie congénitale des surrénales.

En 1951 : il expérimente la cortisone et constate son action sur l'hyperandrogénisme.

Ultérieurement il publiera des observations qui relatent les effets de la cortisone sur les différents aspects cliniques du syndrome adrénogénital.

En 1953, Emmer

étudie l'hyperplasie congénitale des surrénales et son traitement dans la revue pédiatrique Suisse Acta Helvetica Pédiatrica.

En 1953, Jeune et Charnat

font une étude très complète de ce sujet dans "Pédiatrie de Lyon".

En 1953-54, Benabou

étudie les troubles de l'hyperkaliémie dans cette revue.

En 1954, Decourt et Jayle

dans les "Annales d'endocrinologie" étudient cette affection et ont mis en évidence les troubles sur rénales et les désordres métaboliques.

En 1954, Garabrand, Jellin, Refran

contribuent à notre connaissance étiologique de l'hyperplasie congénitale des surrénales dans "the journal of clinical investigation" et "the american journal of medicine".

Nous ne nous étendons pas sur les acquisitions récentes sur lesquelles nous reviendrons.

[illegible]

Patrick H.....

L'examen montre deux grandes lèvres hypertrophiées qui ont un aspect de verrues. Il n'y a pas de testicules, le clitoris est très développé, il a deux centimètres sur la face dorsale, 1 cm sur la face ventrale, le sac vaginal n'est qu'un sillon creux comme d'habitude, préputial et terminé par un gland ayant à son sommet une petite tassette. A un cm au-dessous de la terminaison du clitoris, se trouve une gouttière en forme de U, ouverte vers le haut et dans laquelle se trouve l'orifice urétral. Le problème du sexe de l'enfant se pose et des examens complémentaires sont pratiqués :

une sonde est introduite par l'orifice urétral, elle aboutit dans la vessie. Aucune communication n'est perçue entre le vagin et l'urètre. L'insertion de ce produit opaque n'est affective par la cavité vaginale.

Les examens ne permettent pas de conclure de façon définitive. Cependant, l'association d'une cryptorchidie et d'un hypospadias fait penser à un pseudo-hermaphroditisme féminin et, devant les signes cliniques, vomissements, tendance au collapsus, le diagnostic de syndrome adrénogénital est évoqué et les examens de laboratoire suivants, pratiqués.

a) dosage du chlore et du sodium urinaire :

$$Cl = 104 \text{ mEq/l}$$
$$Na = 140 \text{ mEq/l}$$

Cette concentration est trop élevée pour un nourrisson qui a perdu du Cl et du Na par vomissements.

b) dosage dans le L.C.U. (car le collapsus empêche la prise de sang).

Cl = 106 mEq/l (normal : 125 mEq/l)
Na = 130 mEq/l (normal : 140 mEq/l)
K = 3,4 mEq/l (normal : 2 mEq/l)

Il y a donc fuite urinaire du sodium et du chlore. D'où légère diminution du sodium et du chlore dans les espaces extra-cellulaires et augmentation du potassium. Ceci caractérise l'insuffisance des hormones minéralo-corticoïdes.

c) dosage des 17 céto-stéroïdes urinaires :
9,5 milligrammes par 24 heures.

Les dosages de 17 céto-stéroïdes sont faits au laboratoire des Enfants Malades. La méthode appliquée est une modification de la technique de Birket et Smith. D'après cette méthode, le nourrisson ne doit pratiquement pas avoir de 17 céto-stéroïdes dans les urines.

Il y a donc hypersecrétion androgénique.

Examens para-cliniques :

On fait un transit digestif qui montre que, pyllore, cardia, oesophage sont normaux; le cadre duodénal est élargi et refoulé en avant comme dans les tumeurs rénales ou para-rénales.

Traitement :

On institue le traitement pratiqué par Wilkins.

Cortisone I.M. 25 mg par jour

DOCA I.M. 2 mg par jour

ClNa 2 gr par jour par voie buccale

Antibiotiques : 100 000 U.I. d'ampicilline.

On constate :

Les vomissements disparaissent, l'enfant reprend son poids et redevient normal, cependant il est encore très grelotté.

Le 18 Septembre, 1 jour après l'admission, l'enfant pèse 3.600

Ionogramme sanguin :

Cl : 130 mEq/l

K : 8 mEq/l

Ionogramme urinaire :

Cl : 140 mEq/l

Na : 140 mEq/l

K : 35 mEq/l

On augmente la D.O.C.A. jusqu'à 4 mg et le ClNa jusqu'à 4 gr.

A ce moment-là, on constate une amélioration réelle : les vomissements diminuent, la courbe de poids augmente : le 5 Octobre l'enfant pèse 3.600.

Nouvel ionogramme :

L'élimination urinaire des 17 cétostéroïdes est de 0,15mg par 24h

Le 10 Octobre 53, on constate :

Cl : 729 mEq/l

Na : 131 mEq/l

On donne : D.O.C.A. I.M. 2mg par jour

ClNa 2gr

Cortisone I.M. 12,5mg par jour

Du 10 Octobre au 5 Novembre 53, l'état général est excellent

Le 6 Novembre, on constate :

des vomissements, des selles liquides, une chute de poids de 200 gr en 24 h. La numération et formule montre 38.000 G.B. dont 8% de polynucléaires.

Il s'agit d'une infection entérale. On prescrit chloromycétine

D.O.C.A. 3mg au lieu de 2mg par jour

ClNa 3gr au lieu de 2gr

Le 7 Novembre, l'état s'aggrave, le poids diminue de 200gr. La déshydratation augmente. Il y a de nombreuses selles très liquides.

Le ionogramme plasmatique est perturbé.

Na : 136 mEq/l

K : 10 mEq/l

Cette poussée d'insuffisance surrénale aiguë a été déclenchée par l'infection entérale.

On fait une perfusion I.V. quotidienne de 350cc de serum physiologique et 400cc de serum glucosé.

On donne : D.O.C.A. 6mg

ClNa 4mg

En trois jours, l'état est complètement amélioré.

Le 19 Novembre 53, l'enfant ne vomit plus. Les selles sont normales. Le poids a augmenté de 600 gr.

Na : 150 mEq/l

K : 7 mEq/l

On ajoute au traitement précédent la cortisone buccale 12,5mg par jour. Le 22 Novembre 17 cétostéroïdes : 1,40mg par 24h.

Le même traitement est appliqué du 1. Novembre au 1er Janvier. L'état de nutrition est excellent. Le poids passe de 4kg à 5Kg600. L'équilibre électrolytique est normal.

Le 1er Janvier 1954, la température s'élève. L'examen révèle une otite et une pneumopathie aiguë traitées par terramycine et chloromycétine.

L'enfant vomit et le poids diminue. Le ionogramme est perturbé :

K : 7,6 mEq/l

On donne : D.O.C.A. 6mg par jour

ClNa 5gr par jour. L'enfant se rétablit.

Le 12.I.54 le poids est à 5.700g L'équilibre électrolytique est bon :

Cl : 100 mEq/l
Na : 140 mEq/l
K : 5,4 mEq/l
I7 céstostéroïdes : 0,87 mg par 24h.

Le 15 Février, dans l'intention de rendre l'enfant à ses parents, la D.O.C.A. I.M. est supprimée et remplacée par un implant de 100mg. On donne en plus :

ClNa : 5gr
Cortisone buccale : 12,5mg.

En quelques jours surviennent des vomissements, une chute de poids progressive, une augmentation du potassium plasmatique à 7 mEq/l, dus vraisemblablement à l'insuffisance de l'implant.

Le 25 Février, de la D.O.C.A. est faite en injection : 2,3 puis 4mg par jour.

Le 10 Mars, l'état général est bon. L'enfant a 6 mois et pèse 6.200gr.

L'ionogramme montre :

Cl : 115 mEq/L
Na : 130 mEq/l
K : 4,8 mEq/l

Le 30 Mars, un pellet de 100mg de D.O.C.A. est implanté la D.O.C.A. I.M. est supprimée on donne ClNa 5gr.

Du 30 Mars au 13 Avril, le poids reste stationnaire.

Le 13 Avril l'implant est enlevé car il y a risque d'abcès.

Le 15 Avril, un troisième implant de 100mg est mis.

Le 6 Mai, une otite déclenche une poussée d'insuffisance surrénale aigüe.

On donne 5mg de D.O.C.A. par jour, dose ramenée rapidement à 2mg.

Du 10 Mai au 1er Juin, l'enfant reçoit le traitement suivant:

D.O.C.A. : 2mg par jour I.M.
ClNa : 5gr par jour

en plus des deux implants de 100mg de D.O.C.A. qu'il possédait déjà.

Le 4 Juin, un nouvel implant de 100mg est fait, la D.O.C.A. est arrêtée.

Le malade a 9 mois, il pèse 7.300gr, mesure 66cm. L'état général est excellent. L'enfant vomit très peu.

L'ionogramme plasmatique montre :

Cl : 102 mEq/l - Na : 130 mEq/l - K : 6 mEq/l.

Le clitoris augmenté de un centimètre, une légère pilosité pubienne, ainsi qu'une tendance à l'androgénisme.

La radio du squelette ne montre pas de maturation osseuse excessive.

Le 10 Mai, les 17 céstéroïdes ont augmenté : 1,70mg par 24h.

Le 1er Juin, la cortisone est élevée à 25 mg par jour.

Le 10 Juillet, l'enfant est rendu à sa famille. Son état est excellent; son poids a augmenté.

Il reçoit le traitement suivant :

Cortisone I.M. 25mg 2 fois par semaine
ClNa 5 gr par jour.

L'enfant doit être suivi régulièrement à la consultation :
bilan et dosage de l'ionogramme, l'efficacité des implants.

Le 20 Aout; K : 6,4 mEq/l

Le 5 Sept. 17 céstéroïdes : 0,15mg par 24h ou 2,2mg/l

Le 27 Sept. K : 6,6 mEq/l

Le 15 Nov. K : 6,8 mEq/l

La pilosité pubienne et la pigmentation de la région génitale ont disparu.

Les 17 céstéroïdes sont dosés :

le 13 Septembre : 0,65mg par 24h

le 15 Novembre : 0,23mg par 24h.

Le 6 Décembre l'enfant revient à la consultation pour un nouveau bilan. Il a 16 Mois.

Les 17 céstéroïdes s'élèvent à 0,70mg

Le Na = 142 mEq/l

le K = 5,9 mEq/l

L'enfant reçoit le traitement suivant :

cortisone I.M. 25 mg 2 fois par semaine

cortisone buccale 25mg par jour

ClNa 5gr.

Le 3 Janvier 1955, l'ionogramme est un peu perturbé.

Cl : 113 mEq/l

Na : 130 mEq/l

17 céstéroïdes = 1,59 mg par 24h.

On décide de mettre l'enfant à la cortisone I.M. tous les deux jours. On donne 7gr de ClNa.

Le 16 Janvier, les parents s'aperçoivent que l'enfant devient

nerveuse. Elle n'a pas grossi depuis Décembre 1954 et pèse 11.200gr.
Elle n'a pas de fièvre, ne vomit pas.

L'enfant est vue par le Docteur Leveque qui demande un nouvel ionogramme.

Le 19 Janvier 1955 :

Na : 133 mEq/l

K : 11 mEq/l

Le taux élevé du K fait penser que les implants sont insuffisants à maintenir l'équilibre électrolytique. Une nouvelle hospitalisation est décidée.

Le 22 Janvier, l'examen montre que les implants ont disparu.
L'enfant pèse alors 11kg300, mesure 80cm, il a 17 mois.

Ionogramme :

Na : 138 mEq/l

K : 5,6 mEq/l

L'électro-cardiogramme ne montre pas de signe d'hyperkaliémie.

On institue un traitement :

D.O.C.A. 2,5mg /24h

ClNa 5gr /24h

cortisone 25mg /24h

Les 17 céstéroïdes sont de 0,32mg par 24h.

Le 3 Février, deux pellets de 100mg de D.O.C.A. sont mis

la D.O.C.A. I.M. 2,5mg est poursuivie de façon
discontinue

la cortisone est diminuée : 25 mg tous les 2 jours.

Le 6 Février, une légère augmentation de la T.A. est constatée,
peut-être à la suite de l'implant.

Ionogramme :

Na : 140 mEq/l

Cl : 100 mEq/l

K : 6,4 mEq/l

Le 12 Février, la D.O.C.A. I.M. est arrêtée

Le 19 Février, on donne de la cortisone : 25mg tous les 4 jours
ClNa : 7gr par jour

Le 20 Février, on note une élévation thermique en relation
avec une petite angine traitée par penicilline. La T.A est de 12-7.

L'ionogramme sanguin montre :

Cl : 99 mEq/l

Na : 125 mEq/l

K : 5,8 mEq/l

Dans l'ionogramme urinaire on trouve :

Cl : 275 mEq/l

Na : 260 mEq/l

K : 70 mEq/l

Les 17 céstéroïdes sont à 0,30mg par 24h.

Le 21 Février, la température diurne à 37°6, la T.A. = 10/5
On institue un traitement :

Cortisone tous les deux jours 25mg
ClNa 5gr.

Malgré la chute de poids importante et les signes d'insuffisance surrénale, l'enfant sort de l'hôpital le 24 Février sur la demande des parents.

Elle y entre à nouveau le 10 Mars, pour perte de poids de 4kg
à 10 jours. Elle ne suit pourtant pas. Sa tension artérielle est de 12/8.

L'ionogramme montre :

Cl : 104 mEq/l
Na : 130 mEq/l
K : 5,4 mEq/l

Le traitement suivant est donné :

Cortisone : 50 mg
ClNa : 5 gr par jour.

Le 16 Mars, on tente de faire un nouvel examen de l'appareil génital, mais sans beaucoup plus de succès, car on injecte la vessie par l'orifice urétral sans pouvoir injecter le vagin, qui souvent, en cas de malade-hémophylémième fébrile débouche dans l'urètre, formant un sinus urétral. On ne tire toujours pas de conclusions définitives.

L'ionogramme sanguin a pour résultats :

Cl : 106 mEq/l
Na : 100 mEq/l
K : 7 mEq/l

Une fois rééquilibrée, l'enfant sort. Elle doit être suivie médicalement.

Le 18 Juillet 1955, elle a 21 mois, elle entre à nouveau dans le service pour vomissements.

Les 17 céstéroïdes sont augmentés

L'ionogramme montre :

Cl : 101 mEq/l
Na : 126 mEq/l
K : 5,6 mEq/l

La palpation abdominale on ne retrouve pas d'implant.

On institue le traitement suivant :

ClNa 3gr
Cortisone 25mg 1 jour sur 2
D.O.C.A. 2,5 mg

Le 2 Aout 1955, l'enfant a deux ans, elle pèse 12Kg900 et

ClNa 7gr
K : 6 mEq/l

On fait deux implants de 100 mg de D.O.C.A.

On donne 7gr de ClNa

25mg per os 3 fois par semaine de Cortisone.

Le 23 Août l'enfant sort. Elle présente un état de santé qui fait diminuer le sel à 4gr, tandis que la dose de cortisone est maintenue.

Le 16 Octobre, le taux de déhydroépiandrostérone, dont le Centre d'étude biologique de l'hôpital Tesson, par une méthode colorimétrique, laquelle l'élimination normale chez un enfant est inférieure à 3mg, est le suivant :

8mg/litre ou
5,6mg/24h.

Le 14 Novembre 1955, une exploration hormonale est faite au Centre d'Endocrinologie de l'École de Médecine de Paris.

Le taux des 17 céto-stéroïdes est de 3mg

9,7 mg / 24h.

en appliquant la même méthode.

Le taux de cortisone :

4 fois 25mg per os

4gr de sel.

4gr de sel.

L'enfant est suivie à la consultation.

Le 12 Décembre 1955, une exploration hormonale est faite au Centre d'Endocrinologie de l'École de Médecine de Paris.

Le taux des 17 céto-stéroïdes est de 3mg

Folliculine

5 gammas / 24h.

17 hydroxycorticoïde

1,5mg / 24h.

Corticoïdes totaux (Gornall)

5,2mg / 24h.

On conclut à la valeur nettement augmentée des 17 céto-stéroïdes, absence de prégnandiol et de Folliculine.

Commentaire :

On ne peut affirmer le sexe de cet enfant, mais il s'agit d'un enfant de sexe masculin. Les signes cliniques, tels qu'on en voit au cours des syndrômes adrénogénitaux, caractérisé par une masculinisation des organes génitaux externes et l'existence d'un sinus uro-génital.

Comment juger de l'insuffisance surrénale ?

Outre les signes cliniques, vomissements, déshydratation, chute de poids, l'ionogramme et, en particulier, la kaliémie, en sont l'élément essentiel. Le métabolisme du potassium semble, en effet, le plus touché.

Dans ce syndrome, nous l'avons vu, les modifications métaboliques essentielles sont celles de la maladie d'Addison.

Le D.O.C.A. et le ClNa sont d'ailleurs dans le sang, alors que le K est anormalement élevé. Le D.O.C.A. et le ClNa agissent très bien sur ces troubles métaboliques et ils jouent sur l'équilibre hydro-minéral, comme nous tenterons de le prouver par la suite. Les doses doivent donc être adaptées aux besoins de l'organisme suivant le degré d'insuffisance surrénale.

Le D.O.C.A. varie de 2 à 7 mg, la cortisone de 25 à 50mg.

Le ClNa de 2 à 7gr en plus du régime habituel.

A l'entrée du malade à l'hôpital, la cortisone et le sel ne suffisent pas à rétablir l'équilibre hydro-minéral, on est obligé

d'augmenter les doses de D.O.C.A. de 2 à 4 mg pour obtenir un résultat sur l'ionogramme.

Lors des poussées d'insuffisance surrénale aiguë, on institue une perfusion intra-veineuse de 50cc de serum physiologique, on donne 6mg de D.O.C.A., on augmente la dose journalière de sel.

Les résultats sont bons, l'équilibre électrolytique est vite rétabli.

Le premier implant est insuffisant, le deuxième est raté, il faut arriver au troisième pour obtenir un bon résultat.

Les 17 céstostéroïdes sont anormalement élevés. Ils devraient être inférieurs à 1mg chez un enfant de cet âge.

La cortisone a pour action de baisser leur taux, sur lequel elle agit en freinant l'ACTH en excès.

A l'entrée du malade, 25mg de cortisone I.M. par jour font baisser les 17 céstostéroïdes de 9,5mg à 0,15mg /24h.

On donne alors, par voie buccale, 12,5mg par jour. Mais cette dose semble insuffisante: elle n'empêche pas l'apparition de pilosité et l'augmentation du clitoris de 1cm.

Le 1er Juin on donne 25mg de cortisone buccale par jour

Le 10 Juillet on donne :

25mg per os

25mg I.M. 2 fois par semaine

Le résultat semble alors satisfaisant.

En Février 1956, nouvelle hospitalisation. L'enfant a 2ans 1/2 il pèse 18kg800, mesure 92cm, sa T.A. est de III/2-7.

Ionogramme sanguin montre :

Na : 140 mEq/l

K : 5,8 mEq/l

Glycémie : 0,66 gr

L'âge osseux est entre 4 et 5 ans: il ne manque que le noyau du coude pour obtenir un âge osseux de 5 ans.

Le rétro-pneumo-péritoine ne montre pas de grosses surrénales.

Le traitement institué est :

10mg de Cortancyl

3gr de sel.

Le 17 Février, une nouvelle exploration hormonale est faite, dont voici les résultats :

G.B.S. I3 13,1mg/24h.

Prégnandioli = prégnanétriol 15,3mg/24h.

17 céstostéroïdes 4,5mg/24h.

Folliculine 25 gammas/24h.

17 hydroxycorticoïdes 2,3mg/24h.

F.S.H. inférieur à 3 U.S/24h. (à l'alcool)

F.S.H. inférieur à 5U.S/24h. (au kaolin)

Les anomalies constatées à la première analyse se confirment avec des éléments nouveaux. En effet, le taux des trois alta stéroïdes et 17 céstostéroïdes est nettement augmenté, on détecte la présence de prégnanétriol.

Un examen psychologique est fait par Mademoiselle Lyard. L'enfant a un psychisme normal, vif; il est difficile de définir ses tendances masculines ou féminines.

Le 29 Février, l'enfant est somnolent, déshydraté; on lui donne 2mg de D.O.C.A.

Le 1er Mars, le K s'élève à 5,5 mEq/l.

Le traitement suivant institué :

Cortancyl : 10mg puis 20 mg

D.O.C.A. : 2mg

Sel : 5gr

Le 10 Mars, le K s'élève à 6,3 mEq/l.

On donne 4gr de sel au lieu de 3gr

3mg de syncortyl au lieu de 2mg.

Le 17 Mars K : 5,9 mEq/l

Le 19 Mars, on augmente encore les doses :

sel 6gr

D.O.C.A. 5mg.

Le 26 mars, le K est à 5 mEq/l. L'enfant semble équilibré.

Des tests de recherche chromosomique sont faits :

1)- citanés : en faveur du sexe féminin.

2)- lames de sang : la morphologie des polymorphes neutrophiles est celle observée chez le sexe féminin.

3)- frottis de muqueuse buccale : présence de sexe chromatine dans 30% des noyaux.

Le 5 avril, l'implantation de deux pellets de 100mg de D.O.C.A. est faite.

Le génitogramme apporte des résultats intéressants : on met en place une sonde dans la vessie et dans le vagin. La vessie est opacifiée avec une solution de diiodone diluée. Le vagin est opacifié au 1% d'iodol. En forçant la réplétion vaginale on opacifie le vagin et l'utérus. On obtient même une image de salpingographie. L'existence d'un appareil génital féminin est donc objectivée de façon indiscutable.

Le 7 Avril, le taux des 17 céstéroïdes est de 0,65mg.

Devant l'aspect pléthorique de l'enfant, on diminue la dose de cortancyl à 10mg.

Le 16 Avril, l'enfant est présentée à Monsieur Debré, qui constate que les problèmes d'équilibration sont plus difficiles que d'habitude.

Cependant, ils semblent en partie, résolus puisque l'ionogramme fait après la dernière implantation est normal.

Le 19 avril, l'enfant sort du service, âgé de 2 ans et 8 mois. Elle pèse 14,5 kg, elle présente une érythrose faciale et un écoulement

Task. № 1e 30 April 1953

173
160
150
140
120

1/30

100

Cortisone I.M.

1034

170
169
170
167
160
150
140
130
120



170

170

170

C. N. 2

D. O. C. A.



170

170

170

170

H..... Patrick



CIMA

D.O.C.A.
2ème
implant
100 mg
3ème
implant
100 mg

Avril

Mai


Juin

Juillet

Août

Septembre

Mr. Patrick



1.95

0.75


0.15

0.34

0.70

Implant
de deux pellets

de 100 mg



3
 5
 7
 150
 240
 1200
 (10)



CL 1/8

0.1

17.410 = 5,6 mg

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
 1.000.000
 1.000.000

1.000.000
 1.000.000
 1.000.000

May

June

July

Aug

September

October

November

lunaire, une pilosité modérée.

Le traitement à faire à domicile est le suivant :

Cortancyl : 10mg
Sel : 6gr.

Il est intéressant de constater qu'un examen radiographique plus perfectionné et plus réussi, des voies génitales, a permis de confirmer ce qu'on avait déduit logiquement. La preuve est faite: cet enfant appelé Patrick, puis Daniel(e) par mesure de prudence, peut définitivement porter un prénom féminin et changer d'état civil.

Durant ce deuxième séjour, des explorations hormonales plus complètes du métabolisme des stéroïdes, en particulier, ont été faites.

Lors de la nouvelle hospitalisation, on constate que les troubles métaboliques de l'enfant sont particulièrement difficiles à équilibrer. Les 17 cétostéroïdes restent élevés, (les dosages ne peuvent être comparés car ils ont été faits par des méthodes différentes), et il faut augmenter la dose de Cortancyl à 20mg pour obtenir un résultat satisfaisant. Mais alors, on voit apparaître des signes d'hypercorticisme, faibles en pleine lune et pilosité.

C'est pourquoi il est très difficile de freiner suffisamment le taux des 17 cétostéroïdes, pour obtenir un âge osseux correct.

L'équilibre hydrominéral est, lui aussi, bien difficile à équilibrer. Le taux de K reste élevé. On est obligé d'augmenter la dose de D.O.C.A. de 2 à 5 mg et le sel de 3 à 6gr. Seule, une implantation de deux pellets de 100mg de D.O.C.A. finit par avoir raison des troubles électrolytiques. Mais il est bien certain qu'une surveillance et un remaniement constants du traitement seront nécessaires.

Enfant âgé de 6 semaines, adressé le 24 Décembre 1954 à l'hôpital des Enfants Malades, hospitalisé dans le service du Professeur Brissaud.

Cet enfant présentait depuis le 20 Décembre environ, des vomissements en jets, irréguliers, accompagnés d'anorexie, de somnolence, d'altération de l'état général, de collapsus.

Une otite avait été diagnostiquée et un traitement antibiotique entrepris.

Antécédents personnels :

C'est un troisième enfant. La grossesse est normale. L'accouchement a un retard de 20 jours sur la date prévue, il est dystocique : présentation de l'épaula. Poids de naissance : 4.600gr. L'enfant est réanimé car il est cyanosé.

À la maternité, on note une hémorragie méconiale très importante et un hypospadias. L'enfant est déclaré comme garçon.

À la sortie, l'enfant avait perdu 500gr. Revenu chez lui, il boit d'abord très bien, puis refuse ses biberons. Pendant les trois premières semaines, on ne note aucun vomissement. Puis, à partir de la troisième semaine, il vomit un peu et boit très lentement.

Cet état persiste jusqu'au 20 Décembre où, habillé, l'enfant pleure fig.

Examen :

L'enfant entre dans le service, dans un état très grave de déshydratation et de collapsus. Il a trois 1/2, pèse 4kg, il est cyanosé, non dyspnéique, très hypotonique. On note une hypothermie à 35°.

On le fait boire, le liquide mis dans la bouche est rejeté immédiatement.

En conclusion, le petit malade présente un aspect préagonalique : il est dans une torpeur profonde, n'a pas de réaction, il est déshydraté et se présente comme un neuro-toxique grave.

L'examen ne permet de retrouver aucun signe capable d'expliquer cet état toxique.

On institue d'emblée le traitement suivant :

Paralysation : 1/2 cc serum physiologique, glucose et bicarbonaté.

Antibiotiques : penicilline, streptomycine

Cortisone : 6mg 2 fois = 12mg

Syncortyl : 1mg.

La tension artérielle remonte, la température également.

Le 27 Décembre, l'enfant est moins déshydraté, l'état général est un peu amélioré; mais il vomit la moindre gorgée, et on est encore bien inquiet à son sujet.

L'appareil génital est examiné. On pensait jusque là qu'il s'agissait d'un garçon porteur d'un hypospadias. Un examen plus approfondi montre en réalité : un scrotum bifide et surtout cryptochide, un hypospadias.

L'association du collapsus, du syndrome de déshydratation grave, et des vomissements à des malformations génitales évoque un syndrome de Debré-Fibiger. Il s'agit d'un clitoris hypertrophié et de deux grandes lèvres soudées, et l'orifice hypospade pourrait être l'ouverture d'un sinus uro-génital, tel qu'on en décrit dans le syndrome de Debré-Fibiger.

La réhydratation par voie I.V. est continuée (1 litre de serum par jour).

Le 26 Décembre, le collapsus empêche toute prise de sang, on doit donc se contenter du :

ionogramme urinaire :

Cl : 87 mEq/l
Na : 73 mEq/l
K : 80 mEq/l

Le 27 Décembre 1954, l'état général est un peu plus satisfaisant, température à 39°. Quelques vomissements peu abondants sont notés. L'examen montre une rhinopharyngite. On fait un prélèvement de gorge, on trouve du staphylocoque doré sensible à la chloromycétine.

Dosages urinaires :

Cl : 144 mEq/l
Na : 130 mEq/l
K : 26 mEq/l

Ceci prouve la suite chlorurée, test d'insuffisance surrénale, le taux normal des chlorures urinaires étant inférieur à 100 mEq/l.

I7 cétostéroïdes : 1,48 mg /24h. Ce taux est supérieur à la normale (1mg), mais n'est pas très élevé. Ils ont été dosés dans le laboratoire des Enfants Malades, par la méthode de Birket et Smith citée plus haut, dans laquelle, seules les traces de I7 cétostéroïdes sont considérées comme normales chez le nourrisson.

Le 28 Décembre, l'état général est excellent, l'enfant a pris 100 gr en 24h., sa température est à 37°5.

On donne :

Cortisone : 18mg I.M. en 3 fois
D.O.C.A. : 3mg
CLNs : 4gr

On peut enfin faire le ionogramme plasmatique :

Na : 123 mEq/l (normal : 135 à 145 mEq/l)
K : 7,4 mEq/l (normal : 4;5 mEq/l)

ce qui confirme le diagnostic.

On retrouve donc les troubles métaboliques de l'insuffisance surrénale : abaissement du Na plasmatique et élévation du K.

Le 31 Décembre, l'état général est meilleur, l'enfant vomit toujours, mais très peu.

Le taux de K diminue sans le sang : 5,4 mEq/l

Un bon résultat est également obtenu sur le taux des I7
cétostéroïdes : 0,21 mg.

Le 2 Janvier en 1955, l'enfant perd du poids, 100gr; il pèse
4Kg100. On constate une certaine raideur de la nuque. Le P.L. est
cependant normale.

Le 3 Janvier, l'enfant n'est plus raide; il reprend le
poids perdu.

On donne : K : 6,3 mEq/l
4mg de D.O.C.A.
Cortisone et ClNa sont poursuivis à la même dose.

Le 7 Janvier : K : 6,8 mEq/l
I7 céstostéroïdes = 0,19mg /24h.

La cortisone I.M. est poursuivie à la même dose
ainsi que le sel : 4gr
et la D.O.C.A. : 6mg.

Le 9 Janvier, on constate une chute de poids de 150 gr, la
température est à 38°. Il n'y a pas de signes d'insuffisance surrénale.
Un prélèvement de gorge montre du staphylocoque doré.

Le 13 Janvier, on tente d'explorer plus à fond les voies
génitales, mais sans succès. Seule la vessie est injectée, et non le
vagin. Aucune conclusion n'est tirée de cet examen.

On fait alors une biopsie cutanée. D'après les travaux de
Moore et Graham, la chromatine serait de 15% chez l'homme et 65% chez la
femme. On trouve qu'il s'agit d'un enfant du sexe féminin.

Le 15 Janvier, un ionogramme plasmatique donne les résultats
suivants :

Cl : 90 mEq/l
Na : 125 mEq/l
K : 7,6 mEq/l

qui met en évidence des signes
métaboliques d'insuffisance surrénale.

Le même traitement est poursuivi :

Cortisone : 18mg
D.O.C.A. : 6mg
ClNa : 4gr

Les I7 céstostéroïdes urinaires sont à 0,22mg /24h.

Du 15 Janvier au 15 Février, l'état général est satisfaisant;
l'enfant prend du poids, il pèse 4Kg300 le 17 Janvier, il a 2 mois; 4Kg700
le 7 Février.

Le 7 Février, les I7 céstostéroïdes urinaires oscillent entre
0,27mg et 0,17mg.

Le 12 Février, le taux de K est encore élevé.

Devant la persistance des troubles métaboliques, on augmente la dose de D.O.C.A. à 9mg.

Le 17 Février, la température s'élève à 38°, l'enfant tousse; l'auscultation pulmonaire décelé quelques râles sous crépitants aux deux bases pulmonaires. S'agit-il d'une atteinte infectieuse ou d'un excès de D.O.C.A. ? Devant l'élévation de la T.A. on penche pour cette deuxième hypothèse. Par prudence, on diminue la dose de D.O.C.A. à 6mg, on supprime le sel pour les trois derniers biberons.

Le 7 Mars, on donne la cortisone par voie buccale, en triplant la dose. Le malade reçoit 50mg par 24h.

On constate une semaine après, une chute de poids, des vomissements qui semblent coïncider avec la prise de cortisone buccale; on reprend la cortisone I.M. : 18mg.

Le 31 Mars, l'état général étant satisfaisant, on essaie à nouveau la cortisone buccale : 25mg par 24h. en 4 fois. La T.A. est élevée : 13-6

Le 2 Avril, le taux de K n'est pas encore normal :

K : 6,5 mEq/l

Un syndrome de Cushing se constitue peu à peu, caractérisé par une bouffissure du visage, une pilosité importante sur le tronc, les membres, la face, vraisemblablement déclenché par des doses excessives de cortisone.

La cortisone buccale est alors baissée progressivement à 20, 15, puis 10 et 5mg; les mêmes doses de D.O.C.A. sont conservées.

Le taux des 17 cétostéroïdes est très bas : on en retrouve des traces dans les urines : 0,03 mg /24h.

A la fin du mois d'Avril, l'état de l'enfant est excellent; la courbe de poids est ascendante, il ne vomit pas.

L'aspect cushinoïde disparaît, seule reste une pilosité assez abondante au niveau du front.

Les points d'ossification correspondent à un âge osseux de 1 an alors que l'enfant a 6 mois.

Le 16 Mai, un dosage des 17 cétostéroïdes urinaires montre leur augmentation à 0,57mg.

La cortisone buccale est augmentée de 10mg.

Le 21 Mai, les corticoides urinaires sont dosés à l'hôpital Tenon :

corticoides réducteurs = désoxycorticostérone :

3,2 mg /l ou 0,9 mg /24h.

2c cétostéroïdes : 1,5mg/l ou 0,45mg/24h.

Au début du mois de Juin, le traitement est le suivant :

D.O.C.A. : 7mg

Cortisone : 10mg

ClNa : 4gr.

Le ionogramme plasmatique s'est amélioré :

Na : 140 mEq/l

K : 5,4 mEq/l, ce taux est toujours un peu élevé

Le 18 Juin, un implant de trois pellets de D.O.C.A. est fait dans la région para-ombilicale droite, ce qui correspond à une dose totale de 275 mg de D.O.C.A.

La T.A. est à II-7

Les I7 cétostéroïdes ont un peu augmenté : 0,75 mg, la cortisone buccale est alors passée de 10 à 20 mg.

Le 21 Juin, l'enfant attrape la varicelle. La dose de D.O.C. est augmentée à 3mg car on craint la répercussion de l'infection sur son équilibre électrolytique.

Le 25 Juin, l'enfant vomit, n'a pas de diarrhée, perd du poids. Ces signes cliniques d'insuffisance surrénale sont confirmés par l'ionogramme plasmatique :

Na : 132 mEq/l

K : 7,6 mEq/l

On pense que ces troubles sont dus à un déficit de D.O.C.A., l'implant n'étant pas encore assez résorbé.

La dose de D.O.C.A. est augmentée : 5 mg /24h. en I.M.

2 gr de sel sont redonnés en plus du régime normal.

Le 7 Juillet

K : 9,4 mEq/l, ce qui est un taux très élevé, mais il s'agit d'un microdosage.

Le 9 Juillet, l'enfant pèse 7Kg975 à 8 mois.

Les implants sont localement très bien perceptibles, il n'y a pas d'organisation fibreuse autour.

L'ionogramme plasmatique ayant montré un taux élevé de K, alors que le Na est normal, on augmente la dose de D.O.C.A. I.M. de 5 à 8mg.

La cortisone buccale est également légèrement augmentée à 25mg.

Voici les résultats des examens pratiqués alors :

Na : 140 mEq/l

K : 9,4 mEq/l

I7 cétostéroïdes urinaires : 0,5mg.

L'enfant part en vacances quelques jours après, avec :
cortisone buccale 25mg
sel.

A la fin du mois d'août, l'enfant a 9 mois, il est à nouveau hospitalisé pour vomissements et chute de poids.

L'ionogramme plasmatique montre :

Na : 140 mEq/l

K : 7,1 mEq/l

Dans l'ionogramme urinaire on trouve :

Cl : 219 mEq/l

Na : 221 mEq/l

ce qui est une concentration trop



2000

3

I60 7

I50 0

I40 5

I30

I20

1 mg

01Ne 4 gr

25


Oct 1908



0.20 mg

normal

Pellets
275 mg
D.O.C.A.



correct 20 mg

June 1955

July 1955

Aug 1955

Sept 1955

Oct 1955

Nov 1955

Dec 1955

Il y a eu une chute de poids en 11 et 12 par vomissements et par la fuite chlorurée urinaire.

Un traitement à base de

Cortisone : 20 mg et

D.O.C.A. : 10 mg.

L'enfant est suivi à la consultation par la suite.

Le 5 Septembre, son état général et électrolytique est très satisfaisant.

Le 22 Février 1956, elle a 15 mois, pèse 10Kg900, son traitement est le suivant :

10mg de syncortyl

25mg de cortisone par jour

Elle ne vomit pas, n'a pas l'aspect cushinoïde.

Le 15 Mars 1956, à l'hôpital Tenon, on fait des dosages hormonaux urinaires qui montrent :

déhydroépiandrostérone : 5,2 mg /l = 0,4mg/24h.

L'élimination normale par 24h. chez l'enfant est inférieure à 3mg.

Le 2 Mai 1956, les 17 céstostéroïdes sont normaux, l'âge osseux normal. L'état général est bon, elle se porte bien, en léger surpoids est noté.

On donne :

10mg de D.O.C.A. 1 jour sur 2

20mg de cortisone par jour.

Un génitogramme fait par Schinzel réussit à injecter le pénis et l'intérus et à prouver ainsi le pseudo-hermaphroditisme féminin.

Le 9 Mai, l'enfant est regu à la consultation, elle est parfaitement bien, avec la D.O.C.A. 1 jour sur 2.

On demande une rectification de l'état civil.

Commentaire :

Il s'agit d'un pseudo-hermaphroditisme féminin, comme le font penser ses malformations associées au syndrome d'insuffisance surrénale, et comme le prouve définitivement le génitogramme.

Revisageons maintenant les conclusions à tirer des nombreux examens, et de la conduite du traitement.

La mise en œuvre, le 15 Décembre 1954, 3 semaines après la naissance, du traitement suivant :

ClNa : 3gr puis 4gr le 9 Janvier

D.O.C.A. : 2, 3, 4 et 6 mg le 31 Décembre

Cortisone I.M. : 12,5 puis 20mg le 31 Décembre

Perfusion de sérum salé et glucosé

corrige les troubles cliniques : vomissements, déshydratation. Les troubles métaboliques s'arrêtent, puisque le K reste élevé assez longtemps.

Les 17 céstostéroïdes diminuent progressivement de 1,2 mg/24h grâce à l'action de la cortisone qui freine l'axe H.A.

Devant l'insuffisance des résultats sur le métabolisme hydro-salé, on augmente la dose de D.O.C.A. à 9mg. L'apparition de pathologies la font diminuer à 6mg.

Donc, qu'il s'agisse de la D.O.C.A. ou de la cortisone, une surveillance clinique sévère est nécessaire pour éviter les excès de thérapeutique et donner cependant la dose efficace, apte à équilibrer l'ionogramme et à freiner les 17 céstostéroïdes.

L'augmentation des 17 céstostéroïdes favorise la maturation osseuse. La cortisone en freinant l'hyperandrogénisme, a une action sur l'ossification de l'enfant, mais insuffisante jusqu'à six mois, il a un âge osseux de un an.

Dans cette observation, il apparaît que l'hyperandrogénisme est rapidement freiné par la cortisone. Par contre, l'équilibre hydro-minéral est beaucoup plus difficile à obtenir. En effet, le K reste élevé pendant trois mois environ, puis il revient à un taux normal, ainsi que le Na, avec un traitement de

7 mg de D.O.C.A. I.M.
10 mg de cortisone buccale
4 gr de ClNa

L'implantation des pellets perturbe à nouveau cet équilibre, car la résorption est lente.

Il faut constamment tenir compte des signes cliniques, des examens de laboratoire, pour maintenir un équilibre hormonal précaire et éviter les excès de thérapeutique.

Observation N° 3

L..... Daniel

Ce garçon de 11 jours fut envoyé à l'hôpital des Enfants Malades, parce qu'il présentait depuis la veille, vomissements, crises douloureuses, collapsus, qui, étant donné les antécédents collatéraux, évoquaient un syndrome de Débré-Fibiger.

Antécédents héréditaires :

Aucune anomalie familiale, aucun signe d'insuffisance surrénale ne sont retrouvés. Les aînés présentent des kystes dermoïdes sur les membres, dont la nature serait à préciser par biopsie.

Antécédents collatéraux :

Ils sont beaucoup plus intéressants à étudier : 4 frères sont morts de façon semblable, à tel point qu'il est impossible par l'interrogatoire d'individualiser leur histoire.

La naissance se passe sans incident. Les enfants n'ont pas été réanimés, n'ont pas présenté d'ictère. Ils avaient des organes sexuels et urinaires normalement développés, sauf le deuxième qui avait eu besoin d'une intervention : il s'agissait probablement d'un hypospadias.

Ces enfants étaient parfaitement bien portants jusqu'au septième jour. Vers cette date, survenait d'abord, un bruyet amaigrissement intense et passager. Entre le huitième et le quatorzième jour apparaissent des vomissements d'abord époussés, puis répétés, abondants, en fèces.

Ces enfants présentaient un syndrome douloureux intense, ils criaient pendant des heures sans être soulagés par les médicaments. La déshydratation était rapide et impressionnante. Ils se refroidissaient facilement. Il était impossible de les réchauffer. Ils étaient fréquemment cyanosés.

Les parents signalent que leurs enfants auraient grandi d'une manière extraordinaire dans les jours qui précédaient leur mort. Le deuxième, d'après le médecin de famille, aurait atteint la taille d'un an. Aucun trouble de la pilosité n'est signalé.

Antécédents personnels :

C'est un cinquième enfant, né le 10 Octobre 1954. L'accouchement est normal. Le poids de naissance est : 3kg500. L'enfant est bien portant jusqu'au septième jour.

Le 10^e jour, apparaissent :
des vomissements
des crises douloureuses,
une tendance au collapsus

Le 11^e jour, l'enfant est hospitalisé. A l'examen, il est un peu pâle, fatigué, légèrement hypotonique. Les divers organes : coeur, poumon, foie, rate sont normaux. Les organes sexuels sont normalement développés : les deux testicules sont présents sous une peau normale.

Le 23 Octobre 1954, l'enfant pèse 3Kg220 et mesure 55 cm.
Après avoir été traité pendant 10 jours, on peut constater un état
de bonne fatigue, ce qui est confirmé par les examens de laboratoire.

L'élimination urinaire de chlorure de sodium
est de 4,23gr%

Le Na sanguin est de 2,99gr %

Le K sanguin est élevé à 280 mg %

Les 17 céstéroïdes sont augmentés à 7,20 mg.

L'action rapide de la thérapeutique :

D.O.C.A. : 2,5 mg

ClNa : 2 gr

Plasma de quinton 60 cc matin et soir,
renforce le diagnostic.

Le 17 Octobre, l'état de l'enfant est amélioré. Les jours
suivants, le poids augmente régulièrement, en maintenant le même traitement.

Le 20 Octobre 1954, l'enfant vomit et semble fatigué. Le
bilan biologique montre une élévation du potassium.

On ajoute 5 mg de Cortisone au traitement antérieur.

Les vomissements s'arrêtent. L'état général s'améliore.

L'enfant pèse 3Kg370.

Le 27 Octobre 1954, l'enfant est hospitalisé aux Enfants
Malades, dans le service du Professeur Rayer. Le bilan biologique montre :

Cl : 98 mEq/l

Na : 126 mEq/l

K : 8,4 mEq/l

L'équilibre électrolytique est donc perturbé. Devant ce
résultat, on est obligé de modifier le traitement tout d'abord proposé
(cortisone et chlorure de sodium) et d'ajouter une dose de D.O.C.A. de 2,5mg.

L'enfant reçoit donc le traitement suivant :

Cortisone : 25 mg

D.O.C.A. : 2,5 mg

ClNa : 3 gr.

Il pèse 3kg450, mesure 55 cm, vomit encore un peu.

Le 31 Octobre, on augmente la dose de D.O.C.A. de 2,5 à 3,5 mg.
Le ClNa de 3 à 4 gr.

Le taux des 17 céstéroïdes urinaires est de 1,56 mg (dosé
aux Enfants Malades, méthode de Birket et Smith modifiée).

Le 6 Novembre, l'ionogramme plasmatique est encore perturbé :

Na : 133 mEq/l

K : 8,4 mEq/l

Cl : 114 mEq/l

Après un traitement général, l'état s'améliore.

Le 10 Novembre, l'enfant est encore dans le même état, mais on
peut constater une amélioration dans le bilan biologique. Sans doute est-il stabilisé
par l'augmentation de la dose de DOCA à 5 mg.

Le 4 Décembre 1954, la cortisone I.M. est reprise à raison de 25 mg tous les deux jours.

Le 10 Décembre 1954, l'ionogramme plasmatique montre une légère augmentation du Potassium.

On fait un nouveau dosage des 17 cétostéroïdes urinaires qui les montre abaissés à 0,46 mg (aux Enfants Malades).

Au début du mois de Janvier 1955, l'enfant fait une diarrhée infectieuse traitée par chloromycétine. Il perd du poids. Ces troubles retentissent sur l'ionogramme plasmatique.

Na est abaissé : 125 mEq/l

K est élevé : 7,4 mEq/l

On donne pendant quelques jours une dose journalière de 12,5 mg de Cortisone, puis on revient à la dose initiale.

D.O.C.A., dose augmentée à 10 mg

Sel 3 gr à 3,5 gr.

L'ionogramme plasmatique s'améliore :

Na : 142 mEq/l

K : 6 mEq/l

Les 17 cétostéroïdes continuent à baisser.

L'état général est bon.

Le 17 Février 1955, à l'âge de 4 mois et 10 jours, l'enfant pèse 6Kg400. Les 17 cétostéroïdes sont à 0,12 mg/24h.

Le 12 Février 1955, on a remplacé les piqûres I.M. de D.O.C.A. par trois implants de 100 mg de D.O.C.A. Il semble y avoir une légère amélioration sur l'ionogramme plasmatique. On trouve Na à 145

Le 10 Mars, l'enfant pèse 7Kg000, mesure 64 cm. Il possède des points d'ossification normaux pour 7 mois.

Le 18 Mars 1955, on dose les 17 cétostéroïdes par une autre méthode à l'hôpital Tenon. On trouve

6 mg/l de déhydroépiandrostérone = 1,3 mg/24h.

normalement inférieur à 3 mg chez l'enfant.

Le 2 Mars 1955, 17 cétostéroïdes 0,36 mg/24h.

Durant les mois d'Avril et Mai 1955, le développement est normal, le poids augmente, il est de 10Kg à la fin du mois. L'équilibre ionique est réalisé avec le traitement suivant :

D.O.C.A. : 3 implants

sel : 3,50 gr

Cortisone : 75 mg par semaine en 3 fois.

Le 11 Mai, le dosage des 17 cétostéroïdes par une autre méthode à l'hôpital Tenon, donne les résultats suivants :

Déhydroépiandrostérone : 2,5 mg/24h.

les corticoïdes réducteurs, dosés en
désoxycorticostérone sont à 0,9 mg/24h.

Le taux normal chez l'enfant est inférieur à 2mg

Les corticoïdes 20 céstostéroïdes, dosés par la
méthode de Cornali et Mac Donald, s'élèvent à
2 mg/24h. (taux normal : inférieur à 2 mg)

Le 11 Mai 1955, on constate que l'enfant âgé de 7 mois pèse
5100g, mesure 68 cm, son psychisme est vit, il dit quelques mots.

Le radio du squelette, confirme l'avance de l'ossification
(âge osseux de 10 mois). Le C.A. est normale 7,5-9. Le potassium sérique
se maintient autour de 5 mg.

Le 16 Mai 1955, les 17 céstostéroïdes dosés par une autre méthode
sans modification du traitement, s'élèvent à 0,5 mg/24h. Ce qui prouve
que les résultats ne sont pas comparables.

Le 28 Juin 1955, on remplace les 3 injections de Cortisone par
une seule injection d'acétate d'hydro-cortisone de 75 mg/semaine.

L'enfant fait alors une diarrhée à colibacilles pathogènes,
traitée par tefomycine, puis néomycine, griséofulvine.

Ceci ne retentit ni sur le corps pondérale qui est bonne, ni
sur l'ionogramme plasmatique.

Le 11 Juillet, 17 céstostéroïdes : 0,1 mg /24h.

Le 18 Juillet, l'enfant est rendu à sa famille. Son état
général est parfait. Il pèse 5610g, mesure 69 cm, l'examen somatique
montre une avance staturale-pondérale modérée.

L'ionogramme est tout à fait équilibré avec le traitement
suivant :

sel 4 gr par jour

acétate d'hydrocortisone 75 mg /semaine.

On compte sur l'efficacité des implants et l'action de la
cortisone sur le métabolisme hydro-minéral pour maintenir l'équilibre
électrolytique.

L'enfant revient en Octobre 1955 pour un nouveau bilan biologique
qui est satisfaisant ainsi que l'ionogramme.

Les dosages sont faits à l'hôpital Tenon, les 17 céstostéroïdes
dosés par une méthode différente donnent les chiffres suivants :

déhydroépiandrostérone : 1,2 mg/l = 0,3 mg/24h.

désoxycorticostérone : 5,4 mg/l = 1,3 mg/24h.

corticoïdes 20 céstostéroïdes : 3,4mg/l=0,85mg/24h.

La maturation osseuse est nettement en avance sur l'âge, elle
est de 3 ans chez cet enfant de 15 mois. C'est pourquoi on propose
d'augmenter la dose de cortisone à 40 mg injectable, 3 fois par semaine.

Les implants étant toujours actifs, on ne donne pas de D.O.C.A.

L'enfant prend 3 à 4 gr de sel en plus d'une alimentation
normalement salée.

Le 3 Février 1956, on sait que l'enfant est encore en vie,

..... Janica

0,46 m/s

17 céto : 7,26 m/s

2 50 m/s

Traitement

D.O.C.N.

7 m/s

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$

500

qu'il a pris 1cm1/2 de taille, que la maturation osseuse ne s'est pas accélérée. On pense donner de Corticanyl 3 fois 5 mg en comprimés plus 5 gr de sel.

Commentaire :

L'intérêt de cette observation, réside dans le fait que l'hyperplasie des surrénales apparaît chez un garçon. Le diagnostic est extrêmement difficile à faire. En effet, l'enfant se présente comme un toxique ou un vomisseur, et rien n'oriente le diagnostic, le surrénalome n'est pas encore visible.

Si l'enfant n'avait pas eu des frères morts au bas âge de façon la plus habituelle, et si le médecin de famille n'avait pas eu l'idée assez générale, de faire ce diagnostic, l'enfant mourrait au bas âge comme ses frères et sœurs.

La corticothérapie thérapeutique, relevant de la maladie est mise en évidence, puisqu'il y a des cas dans la famille et non dans les ascendances directes.

Quelles sont les répercussions de traitement sur le métabolisme hydrominéral ?

On remarque dans une première période l'instabilité du K, test le plus sensible paraît-il, malgré une dose importante de Cortisone : 25mg par 24h. en I.M. Elle disparaît lorsqu'on augmente le sel de 2 à 4 gr, en se basant sur le sel urinaire excrété, et la D.O.C.A. de 2 à 6 mg.

La cortisone semble avoir un effet sur le métabolisme hydrominéral puisque :

son arrêt entraîne une diminution du Na à 130 mEq/l

sa reprise, une augmentation du Na à 140 mEq/l

la diminution de la dose à 12,5 mg/24h. produit :

une élévation du K à 7,5 mEq/l

une diminution du Na à 125 mEq/l

L'efficacité des implants de D.O.C.A. sur le métabolisme hydrominéral est très importante. Ils ont été mis en Février, en Octobre leur action se fait encore sentir.

On remarque la sensibilité de ces malades aux agressions : la moindre infection perturbe l'équilibre électrolytique.

Etudions les effets de la cortisone sur le taux des 17 céstostéroïdes. Une dose faible de cortisone : 5 mg pendant 4 jours et 25 mg pendant 3 jours a un effet immédiat sur le taux des 17 céstostéroïdes, qui tombent de 7,28 mg à 1,96 mg au début du traitement.

Des doses de Cortisone de 25 mg en 2 jours ou 3 jours, puis l'acétate 3^ehydrucortisone, 75 mg par semaine suffisent à maintenir les 17 céstostéroïdes à un taux normal.

Cependant, elles ne suffisent pas à freiner l'accélération de la croissance, et la maturation osseuse, qui est de 3 ans lorsque l'enfant a 15 mois. On donne alors 40 mg de cortisone 3 fois par semaine.

Observation N°4

Michel C.....

Cet enfant est actuellement hospitalisé dans le service du Professeur Mozziconacci, à l'hôpital des Enfants Malades.

Nous présentons cette observation parce qu'elle permet des discussions étiologiques intéressantes.

Le début des troubles remonte au 12 Mars.

L'enfant est anorexique, il présente des alternatives de somnolence et d'agitation.

Le 13 Mars, le matin il refuse son biberon. A 10h. on note, après un d'abord normal et de régurgitations alimentaires, puis bilieuses, la survenue de vomissements, parfois mélangés sanguinolents. Un état grave s'installe, l'hospitalisation est alors décidée.

Antécédents :

Il s'agit d'un premier enfant, la grossesse est normale, l'accouchement est en retard de 15 jours, les forces sont nécessaires, il y a un peu de sang au placenta. Aussitôt l'enfant est immédiatement, la poids de naissance est de 3kg900. L'enfant se présente comme un garçon, sans qu'on puisse noter aucune anomalie de l'appareil génital. Il est au sein jusqu'au 29 Février, pendant cette période il ne prend pas de poids de façon satisfaisante, le 15 Mars il ne pèse que 3kg650. Malgré de nombreux changements de lait, la chute de poids continue.

Les antécédents familiaux sont normaux.

Examen :

L'enfant est dans un état très grave de déshydratation et de collapsus, qui évoque une toxicose.

Les bruits du coeur sont à peine perceptibles, la T.A. est inappréciable, la scapula montre un petit cœur qui bat très faiblement. L'examen pulmonaire et l'examen neurologique sont normaux. On ne trouve toujours aucune anomalie des organes génitaux. Les téguments ne sont pas pigmentés.

Donc hypotonie et collapsus cardio-vasculaire dominant le tableau clinique.

A la contre-visite, l'enfant présente un état alarmant : il est très déshydraté, les extrémités sont refroidies, il est déshydraté, la fontanelle est déprimée, le pli cutané persistant.

La P.L. montre :

une albumine à 1,10
leucocytes I

le tracé est très perturbé, il y a une bradycardie ventriculaire à 25, avec dissociation auriculo-ventriculaire complète. Ce tracé est d'un pronostic très grave, il précède généralement la mort.

Une paracentèse est faite, qui ne ramène aucun pus.

Le traitement institué, est le suivant :

serum physiologique	: 300 cc en perfusion I.V.
serum glucosé	: 200 cc
pénicilline	: 1.000.000
cortisone I.M.	: 10 mg.

A 10h. les résultats sont remarquables, la transformation spectaculaire. Les bruits du coeur sont perceptibles, le rythme cardiaque normal, la déshydratation a diminué, le teint est rosé. Ces résultats sont étonnants étant donné la gravité de pronostic de l'E.C.G..

Le 15 Mars, l'état général est amélioré, le rythme cardiaque variable, la T.A. est à 6-3.

L'E.C.G. est normal, on ne note que quelques modifications de l'onde P.

On est frappé par l'amélioration rapide provoquée par le sel et la cortisone. On évoque le diagnostic de Debré-Fibiger. On décide de faire un dosage des 17 céstéroïdes urinaires et une épreuve d'arrêt du traitement.

Les examens bactériologiques du prélèvement de gonge et des selles sont normaux. Le F.O. et les radiographies pulmonaires et du crâne également.

L'ionogramme sanguin donne les résultats suivants :

Cl	: 100 mEq/l
Na	: 138 mEq/l
K	: 6 mEq/l

Dans l'ionogramme urinaire, on trouve :

Cl	: 70 mEq/l = 28 mEq/24h.
Na	: 80 mEq/l = 32 mEq/24h.
K	: 38 mEq/l = 15 mEq/24h.

Le 19 Mars, le poids est à 3kg600. L'état général est bon, la T.A. est à 8-5.

Des dosages hormonaux urinaires sont faits par le Professeur Jayle.

créatinine	: 0,07 gr/24h.
3 OH (G.B.S. I3)	: 5,6 mg/24h.
prégnandiol	: 2,7 mg/24h.
folliculine	: 0
I7 céstéroïdes	: 2,5 mg/24h.
I7 hydroxycorticoïdes	: 1,3 mg/24h.
corticoïdes totaux	: 6,1 mg/24h.

En conclusion, on est surpris du volume urinaire et de la créatinine, qui sont supérieurs à la normale pour un enfant d'1 mois. Le taux des 3 alfa stéroïdes et des I7 céstéroïdes est très supérieur à la normale. Il y a une quantité non négligeable de prégnandiol, mais il ne semble pas que ce soit du prégnanétriol.

On donne 10 Mg d'hydrocortisone.

Le 21 Mars, voici les résultats de l'ionogramme urinaire :

Cl : 25 mEq/l

Na : 105 mEq/l

K : 82 mEq/l

On donne 4,5 mg dehydrocortisone.

Le 22 Mars, l'enfant vomit, présente une dyspnée importante. Les examens bactériologiques sont toujours négatifs.

Le K sanguin reste élevé : 10 mEq/l. Mais il est dosé sur sang hémolysé.

Devant ces troubles électrolytiques persistants, on décide de donner 2 mg de D.O.C.A.

L'E.E.G. montre un tracé un peu ample avec un rythme un peu rapide non concluant.

Le 28 Mars, on supprime hydrocortisone et syncortyl, on donne de la cortisone en deux fois.

L'ionogramme sanguin :

Cl : 118 mEq/l

Na : 150 mEq/l

K : 7 mEq/l

Glycémie : 0,56 gr.

Le 31 Mars, il y a une chute de poids de 200 gr, une légère diarrhée. On donne :

30 mg de cortisone.
L'urogramme et l'urologie met en évidence un arthrose mâle indiscutablement.

Le 3 Avril, l'état est satisfaisant, on continue la cortisone à la même dose.

Le 5 Avril, on donne 2 mg de D.O.C.A.

Le 8 Avril, des vomissements surviennent. On donne 30mg de cortisone.

Un ionogramme sanguin est fait :

Na : 14 mEq/l

K : 10,6 mEq/l (dosé sur sang hémolysé)

Le 12 Avril, devant la prise de poids excessive, l'enfant ayant pris 175 gr en deux jours, on diminue la dose de D.O.C.A. à 1 mg.

Le 15 Avril, on présente l'enfant à Monsieur Debré. Il pense que le diagnostic de syndrome de D.O.C.A. est exact, et que l'épreuve de l'ionogramme sanguin est négative. Mais les vomissements, les organes génitaux semblent normaux, les urines sont augmentées. Mais le diagnostic exact est difficile à faire. Le tableau clinique ne donne pas ce tableau clinique, et ceux-ci n'ont pas d'étiologie.

Le 16 Avril 1957, on arrête la cortisone.

est bon, l'ionogramme sanguin donne les résultats suivants :

Ca : 18 mg/l

K : 38 mg/l

Le 23 Avril, l'ionogramme sanguin est fait :

Cl : 112 mEq/l

Na : 138 mEq/l

K : 5 mEq/l

Du 19 au 28 Avril, l'état général est bon.

Le 25 Avril, après 4 jours d'arrêt du traitement, on trouve :

17 cétostéroïdes : 0,47 mg

G.B.S. : 3,4 mg

corticoïdes : 0,6 mg

Le 27 Avril, on note une petite régulation, une légère hypotonie, le poids est stationnaire, l'E.C.G. est normal.

Le 29 Avril, les vomissements surviennent fréquemment, accompagnés d'anorexie. Une hypotonie importante est retrouvée à l'examen.

Le 30 Avril, le teint est gris, l'anorexie importante, le T.G. à 6,5-3.

Le 1er Mai, l'état est identique, les bruits de cœur sont faibles, on donne 10 mg de cortisone.

Le 2 Mai, l'enfant est fatigué, l'hypotonie est nette. L'E.C.G. est normal en dehors d'une légère sous-dépression de S.T. en D₂.

L'ionogramme sanguin montre :

Cl : 93 mEq/l

Na : 140 mEq/l

K : 10,8 mg/l (niveau non normal)

Glycémie : 0,72 gr.

Le 3 Mai, l'enfant va mieux, mais son poids n'augmente pas.

Du 5 Mai au 6 Mai, le poids augmente de 100 gr. On donne la cortisone à 25 mg.

Du 8 Mai au 11 Mai, l'enfant prend 100 gr par jour.

Le 11 Mai, après arrêt du traitement, on trouve :

17 cétostéroïdes : 1,7 mg (Avec à l'hôpital des Enfants Malades).

Discussion :

L'enfant se présente comme un toxique grave. Le diagnostic est difficile. Il présente comme une infection virale, aucun cas identique dans la littérature. Seul, un tracé d'hypertension et une régression spontanée sous l'effet du traitement, suggèrent le diagnostic.

L'ionogramme sanguin met en évidence des troubles électrolytiques d'insuffisance surrénale avec hyponatrémie sévère et surtout hyperkaliémie.

La cortisone ne corrige pas définitivement les troubles et l'équilibre humoral est instable. On doit donner de la D.O.C.A.

La D.O.C.A. corrige les troubles incomplètement : en effet le Na s'abaisse au lieu de s'élever, mais le K qui est le test le plus sensible s'abaisse de 10 à 5 mEq/l.

Que penser de l'épreuve de l'arrêt du traitement, il semble que son action soit un peu longue à se faire sentir sur l'équilibre hydrominéral. Il faut cependant noter un fléchissement de l'état général et une aggravation de l'ionogramme.

On reprend la cortisone le 1er Mai sans D.O.C.A.. L'hyperkaliémie est toujours considérable, mais l'état général de l'enfant s'améliore, son poids augmente. La cortisone semble donc agir efficacement.

Le taux des 17 céstostéroïdes n'est pas très élevé, il est généralement à 5 ou 10 mg quoique quelques fois qu'on tait de 17 céstostéroïdes supérieur à 2 mg soit suffisant pour faire le diagnostic d'hyperplasie congénitale des surrénales.

Le dosage a été fait 15 jours après l'admission de l'enfant, il avait à ce moment-là reçu de la cortisone tous les jours à raison de 10 à 20 mg par jour. Le taux des 17 céstostéroïdes pouvait très bien être faussé.

L'autre point pendant l'arrêt du traitement ne s'est pas refait de dosage de 17 céstostéroïdes.

Le taux de 17 céstostéroïdes élevé est peut-être un résultat du métabolisme cortisonique, la cortisone n'ayant pas été arrêtée avant le dosage. C'est pourquoi il est difficile de conclure sur cette seule analyse. En effet, la cortisone est métabolisée par le foie et transformée en dérivés qui s'éliminent par les urines et sont éliminés avec les 17 céstostéroïdes.

L'élévation des 17 céstostéroïdes est le facteur de l'hyperplasie congénitale des surrénales, ainsi que celle du prégnanetriol bien qu'il n'y ait pas de prégnanetriol.

En conclusion, il y a une insuffisance surrénale modérée avec une hyperkaliémie insupportable. Mais peut-on dire à une hyperplasie congénitale des surrénales ou s'agit-il d'une insuffisance surrénale fonctionnelle transitoire type Jaudon, ou d'une forme associée avec insuffisance surrénale seule, ou d'un autre trouble métabolique ?

Il est évident que l'hyperkaliémie s'explique par l'hyponatrémie et l'hypotension, on se demande s'il ne s'agit pas d'un trouble métabolique lié à une insuffisance rénale. Des explorations seront faites pour cela : urée, créatinine du sérum, du sang et de la urinaire après arrêt du traitement.

SYMPTÔMES

Le syndrome est très rare, et depuis qu'on sait le


causer, on en a rapporté dix cas chez des adultes; à partir de 1951, les observations se multiplient; en 1953, Jeune et al. rapportent 113 cas.

Les symptômes sont plus facilement détectés dans le sexe masculin que dans le féminin; en fait, les 2/3 des cas se retrouvent dans ce sexe.

Les 3/4 des cas se voient à la naissance, ou dans la première année, beaucoup plus tard. Il est aisé de constater, d'après les observations rapportées, que les cas familiaux sont fréquents. Les parents sont souvent atteints, mais les enfants ne le sont jamais. D'autre part, dans une même fratrie, tous les enfants ne sont atteints indifféremment. On peut donc affirmer qu'il s'agit d'un caractère génétique, non lié au sexe, transmis selon le mode récessif.


Les symptômes sont très variables, et peuvent être très graves, mais ils sont souvent très légers, et peuvent même passer inaperçus.

Arbre généalogique de L.




Observation de Dijkhuisen

sexe non vérifié



Observation de J. J. J.



Observation de Thelander



Observation de J. J. J.



DIAGNOSTIC DE L'HYPERTROPHIE CONGÉNITALE DES GONADES

Diagnostic clinique

1. Les manifestations d'hypertrophie

La surabondance des IT se traduit par une hypertrophie des gonades. Elles sont biologiquement actives. Elles déterminent des malformations génitales différentes chez la fille et chez le garçon.

Chez la fille :

une masculinisation précoce de l'appareil génital se produit. Elle se traduit par le pseudo-hermaphrodisme féminin.

Une étude du développement embryologique de l'appareil génital nous permet de comprendre ces malformations.

Le sexe est déterminé par un facteur génétique. Mais, pendant les trois premiers mois de la grossesse, l'appareil génital est mixte. Puis il s'oriente vers le sexe définitif grâce à des substances hormonales sécrétées par l'épithélium germinatif, et dont la nature est déterminée par les chromosomes sexuels.

Ces hormones androgènes, progestérone, œstrogènes peuvent agir sur le tissu génital et déterminer des modifications pathologiques.

Chez l'hypertrophie congénitale des gonades, la surabondance de l'appareil génital est causée par la surproduction des IT, sous l'influence d'un facteur foetal. Ils agissent entre le troisième et le septième mois de la grossesse.

Chez l'hypertrophie congénitale des gonades, la surabondance de l'appareil génital est causée par la surproduction des IT, sous l'influence d'un facteur foetal. Ils agissent entre le troisième et le septième mois de la grossesse.

Le Dr Douglas-Gardner : Recent advances in Paediatrics

Il existe une surabondance du système génital d'un côté, et une diminution de l'autre, ce qui donne un clitoris ou un pénis, tandis que dégénère le système Wolffien.

les canaux de Muller se fusionnent pour donner, utérus, vagin et trompes. Un bulbe vaginal se forme avec un orifice qui s'ouvre dans l'urèthre. Puis ce bulbe se développe, descend, constitue progressivement le vagin dont l'orifice est différent de celui de l'urèthre.

Dans le pseudo-hermaphrodisme surrénalien, il y a masculinisation du tubercule génital.

Le développement du bulbe sino-vaginal est inhibé. Le sinus persiste comme un tube étroit. La descente du vagin est entravée. L'urèthre et le vagin partagent le seul orifice externe du sinus qui se présente comme un orifice hypospade formé par la réunion des replis uréthraux bordant le segment phallique. Les petites lèvres qui proviennent de ces replis restent mal développées.

Les impressions cliniques varient entre un clitoris hypertrophié sortant de grandes lèvres rugueuses et un pénis hypospade surmontant un scrotum bifide.

Les glandes para-uréthrales se différencient en lobes latéraux de prostate, mais le lobe ventral n'apparaît pas.

Le vagin et l'utérus peuvent se développer normalement. Donc le degré de la descente vaginale peut refléter l'intensité et la durée de l'androgénisation. De même le degré de la lésion uréthrale et des plis labiaux-scrotaux.

A la naissance, on retrouvera donc différents types cliniques plus ou moins masculins. L'exploration prudente des cavités génitales avec du télescope montre 3 différents aspects du sinus uro-génital.

- sinus de petite taille, aspect le plus fréquent.
- sinus large donnant l'aspect d'un vagin de petite taille, aspect le plus rare.
- absence de communication entre le vagin et l'urèthre, si l'hyperandrogénisme survient après le 5^e mois, cas rare.
- urèthre pénien avec communication vaginale, cas exceptionnel.

Si l'enfant n'est pas traité, un virilisme se constitue. L'hyperandrogénie continuant à exercer ses effets au-delà de la vie embryonnaire.

L'hypertrophie clitoridienne s'accroît progressivement et devient le siège d'érections. Les grandes lèvres s'hypertrophient, et s'il existe, à la naissance, une fente ayant l'aspect d'un petit vagin, elle ne s'allonge pas. Les organes génitaux se pigmentent, une pilosité pubienne et axillaire apparaît vers la deuxième ou troisième année. L'attention des parents est donc attirée par ces symptômes entre 18 mois et 3 ans.

Plus tard, ils s'exagèrent, dans la période prépubérale, témoignant du virilisme croissant.

L'aspect morphologique sera plus masculin que féminin avec des muscles très développés, des humères droites, des épaules larges, une hypertrophie de la face du menton, des membres inférieurs. Les seins ne se développent pas. Les règles s'apparaissent pas.

L'hyperandrogénie entraîne une croissance excessive; la taille et l'ossification sont en avance de plusieurs années; mais, à la puberté, la soudure prématurée des cartilages de conjugaison entraîne un arrêt prématuré de croissance, si bien que l'individu sera finalement petit. L'adolescente est donc brève, musclée, d'un caractère irritable et très indépendant. On voit l'utilité du traitement chez ces sujets menaçant de mener une vie sociale normale.

Chez le garçon :

L'hyperandrogénisme est plus difficile à diagnostiquer. Seuls les dosages biologiques le révèlent.

À la naissance, l'enfant est normal. Puis, dès l'âge de 18 mois, le pénis s'hypertrophie; les testicules restent cependant relativement petites. Des frétilles, éjaculations se produisent, mais sans spermatozoïdes. On voit paraître des pilosité pubienne et axillaire, la voix se modifie, précocement.

Ce tableau réalise donc une fausse puberté précoce.

Wilkins signale un cas de pseudo-puberté précoce chez un enfant de 3 ans 1/2, où, à l'autopsie des testicules, on a trouvé du tissu stromal aberrant avec quelques tubes adrénaux atrophiques.

Iversen signale trois cas de testicules ectopiques sur 57 garçons et six cas d'hypospadias.

D'abord grands, les sujets se développent ensuite mal, par suite de l'action des androgènes sur la soudure des cartilages de conjugaison.

Wilkins, dans "pediatrics" de 1950, insiste sur le fait que l'étude de la maturation osseuse est très importante et permet un diagnostic précoce, même lorsque le taux des 17 testostéroïdes est douteux. L'avance osseuse considérable de l'âge osseux serait une preuve de l'hyperandrogénisme.

2. Les signes cliniques d'insuffisance surrénale-corticoïde :

Chez un certain nombre de cas, il y a une insuffisance surrénale d'hyperandrogénisme, s'ajoutant au syndrome d'insuffisance surrénale-corticoïde. Les auteurs insistent sur la nécessité de dosage régulier.

Il survient assez précocement après la naissance. Il est caractérisé par des accidents progressifs, soit par des accidents bruyants de choc, soit par une décoloration qui rappelle le crise aiguë d'insuffisance surrénale. Le tableau clinique est sévère et nécessite un traitement immédiat.

Analysons les différents signes cliniques qui incitent l'entourage, et amènent à faire le diagnostic de syndrome de Debré-Fabrigar. Jeune et Charrat les analysent dans un article de "Pédiatrie de Lyon" de 1953.

Ce sont : les vomissements plus ou moins abondants, de la simple régurgitation aux vomissements en jet, alimentaires ou bilieux, rebelles aux antiémétiques. Ils surviennent souvent après intervalle libre de deux à trois semaines, entraînent un amaigrissement, une importante déshydratation et font penser à une sténose du pylore. On ne sent pas l'obstacle pylorique, mais les incrustations péristaltiques existent parfois comme dans un cas signalé par Verthezian. Le diagnostic posé à tort, les enfants meurent faute de thérapeutique adéquate. Seul, un examen radiologique prouverait que la sténose du pylore n'existe pas.

La constipation qui accompagne souvent ce tableau, renforce le diagnostic de sténose du pylore, mais la diarrhée est également fréquente.

L'anorexie contrastant avec une faim de sel anormale et une aversion pour les mets sucrés, comme le signalent Thélander et Chaffin, peut être aussi un signe d'alarme. On parle d'un enfant qui naturellement friand de sel, mourut lorsqu'on réduisit sa ration à son entrée à l'hôpital.

La pigmentation de la peau, des organes génitaux, des mamelons, signalée par Butler, Ross et Talbot, est caractéristique.

Dans un article récent, Iversen, fait la statistique suivante : sur 135 cas on trouve :

- des vomissements : 93% des cas
- diarrhée : 33%
- perte de poids : 91%
- déshydratation : 91%
- pigmentation : 13%
- crises (collapses, cyanose, durant de 1/2h. à 1h.) : 65%

Diagnostic biologique

Il est très important d'établir dès le diagnostic différentiel entre l'hyperplasie congénitale des surrénales à type de Debré-Fabrigar et l'hyperplasie congénitale des surrénales à type de Addison. Le seul examen des organes génitaux qui peuvent être identiques à ceux de l'hyperplasie congénitale des surrénales. Le diagnostic repose donc principalement sur les examens suivants :

- le dosage des 17 céstéroïdes urinaires et leur
- la recherche du prégnandiol urinaire
- l'ionogramme plasmatique et urinaire.

Etude des I7 Cétostéroïdes urinaires :

Bien avant l'apparence de virilisation, le diagnostic peut être fait par l'augmentation des I7 cétostéroïdes urinaires. Dès les premiers jours de la vie, le taux est augmenté à 2 et 5mg, au lieu de 0,5mg, qui est le taux normal.

A l'âge de 1 an et 2 ans, le taux est entre 6 et 15 mg.

A la puberté, le taux est de 25 à 50 mg.

D'après Wilkins, un taux de I7 cétostéroïdes supérieur à 2 mg, est un signe d'hyperplasie congénitale des surrénâles. A la naissance, l'augmentation des I7 cétostéroïdes urinaires permet de différencier le pseudo-hermaphroditisme par hyperplasie congénitale des surrénâles, des autres hermaphrodismes.

A l'âge de 1 an et 2 ans, le taux modérément élevé des I7 cétostéroïdes, permet d'éliminer un virilisme par néoplasie.

Les I7 cétostéroïdes peuvent être dosés par plusieurs méthodes :

- par le réactif de Zimmermann, dont voici les taux normaux
 - au-dessous de 8 ans : 1 mg
 - au-dessous de 10 ans : 2 mg
 - au-dessous de 12 ans : 3 à 4 mg
 - au-dessous de 14 ans : 5 à 6 mg
 - au-dessous de 16 ans : 7 à 8 mg

Par cette méthode, un taux de 1 mg sous un mois de vie est considéré comme normal.

- par la technique de Birket et Smith, utilisée aux Enfants Malades et qui donne les taux suivants :

nourrisson	: traces
3 ans	: 0,15
4 ans	: 0,3
5 ans	: 0,4
6 ans	: 0,5
7 ans	: 0,65
8 ans	: 0,95
9 ans	: 1,4
10 ans	: 1,9
11 ans	: 2,6

L'étude qualitative des I7 cétostéroïdes est un argument

pour le diagnostic différentiel des hyperplasies congénitales.

- la méthode chromatographique associée à la spectrographie infra-rouge.
- les méthodes de fractionnement chimique.

Les études chromatographiques ont permis de différencier les hyperplasies congénitales des surrénâles étaient augmentées :

- l'androstérone
- les II oxycétostéroïdes

Elles permettent de faire un diagnostic différentiel avec les tumeurs

cortico-surrénales où la déhydroépiandrostérone est comparativement plus augmentée que l'androstérone et l'étiocolanone.

D'autre part, l'étude faite par les infra-rouges montre qu'il existe chez ces malades, des stéroïdes pathologiques de valeur diagnostique considérable, le prégnane-3-ol-20-one, ou prégnane-3-ol-11-20-dione et prégnane-3-17-di-ol-20-one, d'après un article de "the journal of clinical investigation" daté du 1955, de l'après l'hôpital de Lelong, Jayle et Joseph dans la semaine des Hôpitaux de Mars 1955.

Si le dosage des 17 céstostéroïdes dans le sang est normal, la présence dans les urines de ces stéroïdes pathologiques est un diagnostic.

Les méthodes chimiques permettent un fractionnement rapide des stéroïdes urinaires.

Nous étudierons ici l'une d'elles rapportée par Jayle et Beaulieu dans les archives de pédiatrie de Mars 1955. Celle-ci consiste à extraire par de 17 céstostéroïdes libres extractibles par les solvants organiques comme l'éther et l'acétone. Les 17 céstostéroïdes sont sous forme de dérivés :

sulfoconjugués

glycuroconjugués

La nature de la conjugaison dépend de l'orientation du radical OH fixé sur C3. Selon sa position, on distingue donc :

- les 3 alfa stéroïdes qui sont glycuroconjugués G.B.S.
- les 3 beta stéroïdes qui sont sulfoconjugués S.B.S.

Le fractionnement des 17 céstostéroïdes conjugués par le norbutanol et le soufre-fractionnement par l'acétone et l'hydrolyse ménagée de Talbot permet de les séparer en 4 portions :

- la fraction A contient la totalité de l'androstérone de l'étiocolanone et de petites quantités de 17 céstostéroïdes oxygénés en 11.
- la fraction B contient la déhydroépiandrostérone
- la fraction C contient l'épiandrostérone
- la fraction D (E) des 17 céstostéroïdes oxygénés en 11.

Les données cliniques rapportées par Jayle, Joseph et Lelong dans les archives de pédiatrie de Mars 1955, montrent l'intérêt de l'exploration glyco-stéroïdienne.

Le cas clinique est celui d'un garçon de 4 ans 1/2, normal à la naissance. A 6 mois on note une petite augmentation de la verge. A 18 mois, elle est évidente. A 3 ans, l'apparition de pilosité pubienne, la maturation testiculaire et l'évolution de la ligne épuraire sont notées. L'augmentation des 17 céstostéroïdes : la fraction B qui correspond aux 3 beta stéroïdes est très augmentée : 2600 mg %, alors que la fraction A qui correspond aux 3 alfa stéroïdes glycuroconjugués est comparativement peu augmentée. On observe une tumeur palpable à l'âge de 4 ans, mais qu'aucune tumeur n'est palpable.

On peut conclure que l'on observe une tumeur avec

calcifications visibles à la radio, inopérable, radio-résistante, qui entraîne la mort. L'étude biopsique montre qu'il s'agit d'un épithélioma de la cortico-surrénale. L'augmentation de la fraction B des 17 céstéroïdes urinaires est caractéristique de la néoplasie surrénalienne.

Le deuxième cas est celui d'une fillette de 11 mois 1/2, qui a présenté à 7 mois une pilosité périvulvaire, à 11 mois une hypertrophie du clitoris et des grandes lèvres, une 2^e dilatation.

Le diagnostic de tumeur cortico-surrénale fut fait lors de l'apparition d'une tumeur de l'opécchondre droit et confirmé par l'exploration polystéroïde des urines, qui montrait une augmentation importante de la fraction B des stéroïdes, une augmentation modérée de la fraction A.

Dans un troisième cas de virilisme par hyperplasie congénitale des surrénales chez une fillette de 3 ans, qui avait depuis l'âge d'un an, une hypertrophie du clitoris et des grandes lèvres, un sinus urogénital, une pilosité périvulvaire, l'exploration polystéroïdique des urines montre une élévation de la fraction A des 17 céstéroïdes et du complexe prégnandiol.

Les auteurs concluent qu'au cours de l'hyperplasie congénitale des surrénales, on trouve :

- une augmentation des stéroïdes non cétoniques, du prégnanétriol en particulier.
- une augmentation de la fraction A des 17 céstéroïdes, androstérone et étiocholanone.
- une diminution de la fraction B des 17 céstéroïdes, déhydroépiandrostérone.

Le rapport A/B est donc augmenté.

Au contraire, dans le cancer surrénalien, le sulfate de déhydroépiandrostérone est très augmenté, la fraction A est diminuée. Le rapport A/B est donc diminué.

L'ensemble de ces techniques d'exploration fonctionnelle résoud donc de façon pratique les problèmes physio-pathologiques et étiologiques posés par l'hyperandrogénisme d'origine surrénale.

Voici un exemple d'exploration polystéroïdique par cette méthode. Ses conclusions confirment celles de la méthode chromatographique.

Elle permet le diagnostic différentiel entre tumeur surrénalienne et hyperplasie congénitale des surrénales comme le résume le tableau suivant, (d'après les mêmes auteurs : Lalong, Jayle et Joseph dans l'article de la semaine des Médecins de 1955).

Pathologie

3 α stéroïdes 3 β stéroïdes 17 cétototour
G.B.S. I3 S.B.S. II

Fractionnement (pregnenolone, androstenedione, cortisone, cortisone).

Hyperplasie	+++	+	+++	A +++ B + C +	0	+	17 cétodistansé
Tumeur	+	+++	+++	D +++	+	0	17 cétonon modifiés

Épreuve à la cortisone

Pathologie	anomalies du développement sexuel	augmentation des 17 cétostéroïdes	croissances développement osseux	villosité cervicale	réponse à la cortisone.
Hyperplasie congénitale	clitoris sinus urogénital	+	+	+	+
Etats inter sexuels	anomalies variées	0	0	0	0
Tumeurs surrénales	virilisme	+	+	+	0

L'épreuve à la cortisone :

C'est un test thérapeutique de grande valeur diagnostique. La cortisone fait rapidement baisser les 17 céstostéroïdes dans l'hyperplasie congénitale des surrénales. Elle n'a aucune action sur l'élévation des 17 céstostéroïdes urinaires dans la tumeur surrénale. La cortisone se donne en I.M. ou oralement; les 17 céstostéroïdes diminuent dans les 7 à 10 jours. Une méthode plus rapide consiste à faire une perfusion I.V. de 100 mg d'hydrocortisone pendant 4 h. (pédiatries de 1952).

Cette épreuve permettra de diagnostiquer la cause d'un hermaphroditisme ou d'un virilisme, chez une fille, comme le montre le tableau ci-contre.

Chez le garçon, elle fera le diagnostic d'une puberté précoce.

Etiologie	développement somatique sexuel	17 céto.	Testicules	Réponse à la cortisone
Hyperplasie surrénale	+	+	immatures	+
Puberté précoce constitution, ou centrale	+	taux adolescents	matures	0
Tumeurs surrénales	+	+	immatures	0
Tumeurs des cellules interstitiel.	+	+	tumeur	0

Ici encore, le seul résultat positif de l'épreuve à la cortisone se voit dans l'hyperplasie congénitale des surrénales. Cette épreuve est donc excellente pour faire un diagnostic différentiel.

L'épreuve à l'A.C.T.H. :

Elle est longuement étudiée dans un article des "Annales d'endocrinologie" de 1954, par Decourt et Jayle.

Elle a également un intérêt diagnostique, bien qu'elle soit moins fréquemment employée. Des conclusions pathogéniques importantes en ont été déduites.

La cortico-surrénale étant sous la dépendance de l'adrénocorticotrophine hormone, on comprend qu'une injection d'A.C.T.H. stimule toutes les fonctions de la cortico-surrénale.

Une surrénale anormale, dont le fonctionnement est perturbé, et une surrénale normale, répondront différemment.

Chez le sujet normal, on constate :

- une rétention hydro-saline due à la sécrétion de D.O.C.A.
- une augmentation des 17 céstostéroïdes
- une augmentation des 11 oxystéroïdes et 17 hydroxycorticostéroïdes ou composé F, avec modification de la glycémie.
- une diminution des éosinophiles par augmentation du catabolisme protidique.

Chez le sujet atteint d'hyperplasie congénitale des surrénales

- la rétention saline n'est pas augmentée
- les 11 oxystéroïdes et les 17 hydroxycorticostéroïdes ne sont pas modifiés. La glycémie est peu touchée.
- Les éosinophiles restent inchangés.

L'expérience de Bartter et Albright : A.C.T.H. I.M., administrée pendant 9 à 12 jours à des enfants de 10 à 13 ans, atteints de virilisme ou de pseudo-hermaphrodisme, confirme le résultat.

Jacques Pecourt et Jayle ont observé les effets de la perfusion I.V. de 25 unités d'A.C.T.H. pendant 8 h., en comparant les résultats chez des sujets sains et des sujets atteints d'hyperplasie congénitale des surrénales. L'épreuve a été tentée chez un malade atteint d'hyperplasie congénitale des surrénales depuis 2 ans 1/2, traité par la cortisone I.M. 75 mg tous les 3 jours, ayant une élimination stéroïdique normale. On supprime la cortisone 10 jours avant la perfusion. On constate que les 17 céstostéroïdes ne redeviennent pas aussi élevés qu'avant. Après la perfusion, ces auteurs sont surtout frappés par le fait qu'une suppression courte du traitement et une courte stimulation par l'A.C.T.H., remettent en évidence tous les troubles métaboliques de l'hyperplasie congénitale des surrénales.

Ils constatent:

- l'augmentation des 17 céstostéroïdes
- la non modification des corticoïdes comme dans les autres expériences.

Ils insistent sur le fait que le complexe prégnandiol, contenant le prégnanétriol, augmente considérablement, ce qui met en valeur l'anomalie métabolique de la biogénèse des cortico-stéroïdes.

L'intérêt diagnostique de l'épreuve à l'A.C.T.H., réside en ce que les réponses surrénales sont différentes suivant qu'il s'agit d'une hyperplasie ou d'une tumeur de la surrénale.

En effet la surrénale hyperplasée est sensible à l'action de l'A.C.T.H. et répond par une augmentation des 17 céstostéroïdes principalement. La tumeur surrénalienne fonctionne pour son propre compte et reste indifférente à l'action de l'A.C.T.H..

L'insuffisance gluco-corticoïde est absente ou modérée:

- la glycémie est normale
- le dosage des 11 oxystéroïdes est généralement normal ou peu élevé.
- l'hyperéosinophilie est cependant fréquente.

Il existe donc une dissociation curieuse entre les fonctions minéralo-corticoïdes et gluco-corticoïdes, qu'on a essayé d'expliquer les théories pathogéniques.

Le dosage des hormones glucido-protéidiques est possible.

La méthode de Porter et Lilber, donne les résultats suivants :

chez l'homme 7 mg/24 h.

chez la femme 3,5 mg/24 h.

Par la méthode de Gornall :

chez l'homme 14 mg/24 h.

chez la femme 9 mg/24 h.

Métabolisme des corticostéroïdes :

Le problème des transformations subies par les hormones corticoïdes est des plus complexes. 46 stéroïdes neutres ont été, à l'heure actuelle, isolés dans les urines normales et pathologiques.

Ce nombre permet d'évaluer la complexité des modifications que subissent les potentialités biologiques des hormones stéroïdes.

Les stéroïdes corticoïdes sont d'abord conjugués dans le foie, sous forme d'esters d'acide glycuronique ou sulfurique, puis éliminés dans l'urine.

Le foie détruit la desoxycorticostérone, mais non semble-t-il les II oxystéroïdes.

On classe ces produits métaboliques en :

- corticoïdes, II oxystéroïdes
- I7 céstostéroïdes
- stéroïdes neutres, alcooliques, non cétoniques, dont seul le prégnandioliol peut être dosé.
- phénolstéroïdes ou cestroïdes, c'est à dire, folliculine.

C'est pourquoi, lorsqu'on donne de la cortisone comme thérapeutique, elle est métabolisée par le foie, et transformée en dérivés qui s'éliminent par les urines et sont dosés avec les I7 céstostéroïdes, ce qui fausse le dosage des I7 céstostéroïdes urinaires au cours d'un traitement cortisonique.

Les ionogrammes plasmatiques et urinaires, enfin

sont indispensables au diagnostic du syndrome de Dabré-Wibiger, et à la conduite du traitement. Ils mettent en évidence, la déperdition chlorurée urinaire, signent l'insuffisance surrénale chez un nourrisson vomisseur.

Le dosage des chlorures urinaires est un examen facile qui a une énorme valeur diagnostique, lorsqu'on se trouve en face d'une toxicose dont on ignore l'origine.

Un taux de Cl urinaire ≥ 100 mEq/l permet d'affirmer l'insuffisance surrénale.

Le syndrome biologique est caractérisé par :

Une baisse du Cl et du Na plasmatiques sous élévation du K avec des proportions considérables qui font redouter les accidents d'hyperkaliémie. D'après une statistique de Ivarsen, le Na varie de 90 à 140 mEq/L, le K de 5,2 à 12,2 mEq/L, le Cl est < 95 mEq/L.

L'augmentation du Cl et du Na urinaux, qui sont élevés malgré les déperditions salines dues aux vomissements, réalise le diabète salin, analogue à celui rencontré dans la maladie d'Addison.

Diagnostic chirurgical

La laparotomie exploratrice est à éviter dès que le diagnostic biologique d'hyperplasie congénitale des surrénales est fait, puisque les organes génitaux internes sont toujours identiques.

Une uréthroscope peut être pratiquée, pour explorer le sinus urogénital et ses rapports avec l'orifice vaginal. Un génitogramme par injection de lipiodol est fait dans le même but, surtout si on a l'intention d'intervenir pour rendre les organes génitaux externes conformes au sexe réel.

Une biopsie cutanée peut confirmer le diagnostic, en effet, l'étude de la chromatine cellulaire donne des renseignements sur le sexe chromosomique. Actuellement la biopsie cutanée n'est pas nécessaire, il suffit de faire un frottis de la muqueuse buccale et d'examiner la chromatine des cellules ainsi obtenues ou de faire une lame sanguine et d'examiner le sexe des polymélosaires. Ces méthodes extrêmement faciles, sont d'un précieux secours.

FORMES CLINIQUES.

Les malformations génitales les plus fréquentes ont été exposées. D'autres existent.

Voici les principales formes cliniques rapportées par Jaume et Charvat dans "Pédiatrie".

Forme avec hypospadias

Dans le service du Professeur Rambeim, un enfant est amené à l'hôpital pour prise de poids insuffisante, vomissements, diarrhées.

Il présente un hypospadias périnéal, les testicules sont absents du sac scrotal, bien conformés.

L'hospitalisation est refusée.

Quatre mois plus tard, à l'âge de 6 mois, il n'a pris que 400 gr depuis la naissance. Il présente toujours des troubles digestifs. Il meurt subitement à 8 mois 1/2. L'autopsie montre des testicules iliaques, des surrénales augmentées de volume, pesant 18 et 7 gr. L'examen histologique montre leur caractère adénomateux avec hémorragies microscopiques.

Pseudo-hermaphrodisme masculin.

Cette observation a été rapportée par Zahn.

L'enfant se présente comme une fille à la naissance, avec vagin, vulve, grandes et petites lèvres.

L'autopsie révèle : testicules, canaux déférents, vésicule séminale. Les surrénales pèsent 12 gr, la corticale est hyperplasée et adénomateuse.

Ces cas sont rarement provoqués par une hyperplasie congénitale des surrénales, mais il faut savoir qu'ils existent.

Il est malheureux que l'autopsie des testicules n'ait pu être faite et qu'on ne puisse prouver qu'il s'agit de vrais testicules.

Ce pourrait être, en effet, des surrénales aberrantes.

L'hyperandrogénisme est considéré comme une manifestation de pseudo-hermaphrodisme masculin. Il est pour Wilkins, dû à un facteur génétique. Gardner le considère comme lié à un excès d'oestrogènes maternelles pendant la grossesse. Dans le premier cas, il faudrait penser que l'action des oestrogènes maternelles a été plus forte que celle des androgènes d'origine surrénale.

La même explication pourrait être donnée dans le deuxième cas, qui est un pseudo-hermaphrodisme masculin vrai.

Formes hypertensives.

Elles ont été signalées par Wilkins, chez deux garçons de 2 ans 1/2 dont la T.A. s'élevait respectivement à 20-10 et 16-11, et chez deux filles de 16 et 18 ans qui avaient 15-9 et 21-15.

Cette hypertension est due :

soit à la libération d'adrénaline par compression de la médullaire,

soit à un excès de production de minéralo-corticoïdes car ces enfants ne présentent jamais de syndrome addisonien.

La biopsie montre une hyperplasie de la glomérulaire qui, pour certains, secrèterait les minéralo-corticoïdes.

Wilkins rapporte que la cortisone a un effet sur la T.A. qu'elle diminue. Quel est son mécanisme d'action ? Elle freine probablement l'A.C.T.H. qui dans cette forme libère un excès de minéralo-corticoïdes. Cette épreuve à la cortisone, d'après un article de Decourt, pourrait différencier le Cushing de l'hyperplasie congénitale des surrénales, car la cortisone n'agit pas dans le Cushing.

Formes avec troubles métaboliques divers.

Formes avec hypoglycémie :

Elles ont été signalées par Wilkins (coma hypoglycémique).

Dans les annales d'endocrinologie belges, on rapporte les cas d'une enfant de 28 jours pseudo-hermaphrodite, déshydratée qui, en plus des signes d'insuffisance surrénale, présente des troubles du métabolisme hydrocarboné, caractérisés par l'absence de glucocorticoïde et l'hypoglycémie.

Forme avec hyperkaliémie :

Une observation avec hyperkaliémie importante, dans un syndrome de Lohr-Eibiger à sa phase terminale, est rapportée par Bernheim dans "Pédiatrie" de 1954.

L'enfant a fait, à l'âge d'un mois, un collapsus impressionnant. L'analyse de sang arrive à potassium : 10 mEq/l, il y a donc une hyperkaliémie

considérable, associée à une hypochlorémie et une hyponatrémie.

L'électro-cardiogramme montre :

- un rythme sinusal conservé avec bradycardie
- un énorme trouble de la conduction. Le complexe ventriculaire est élargi 20/100 de seconde dans les déviations périphériques, 30/100 dans les précordiales.
- des troubles de la repolarisation; onde T de très haut voltage, très acuminée, positive dans toutes les dérivations périphériques, négatives en V.L. et V.4.
- le segment ST a disparu sur toutes les dérivations.

Le tracé est tout à fait typique d'une hyperkaliémie. Ces modifications sont réversibles quand le potassium redevient normal.

L'enfant meurt peu après d'une crise d'insuffisance surrénale aigue.

Très intéressantes sont à étudier les lésions myocardites :
congestion et oedème de l'ensemble du muscle
lésions en foyer, type nécrotique
lésions propres de la fibre, segmentation des fibres, modification des fibrilles qui sont réduites au squelette sarcolemmique
vastes zones de myocarde normales.

Des lésions analogues ont été signalées dans un autre cas de forme de Charcot. France et Heil ont observé des extrasystoles auriculaires.

Forme sans hyperandrogénie

Récemment, dans "Acta Paediatrica Belgica" de 1955, les médecins belges Berys, Corbeel, Malorain, ont étudié un cas d'insuffisance surrénale différent du syndrome de Debré-Fibiger, mais dont l'étude présente un intérêt. Il s'agit d'un nourrisson de sexe masculin, chez qui apparaît, peu après la naissance, un syndrome d'insuffisance surrénale portant sur les minéralo-corticoïdes, sans signes nets d'hyperandrogénie. Le traitement D.O.C.A., Olla, cortisone, améliore l'enfant. Mais, vers le cinquième mois, un collapsus l'emporte.

L'histologie montre :

- des surrénales non hypertrophiées
- l'absence de glomérulée
- l'atrophie de la fasciculée contrairement au syndrome de Debré-Fibiger où elle est hypertrophiée.

L'épreuve à l'A.C.T.H. ne produit pas d'augmentation des 17 céstéroïdes. La recherche du prégonadotrofine est négative, les cellules antérieures de l'hypophyse sont normales, les corticotrophines suffisantes.

On pourrait conclure que l'absence de stéroïdes minéralo-corticoïdes et que l'atrophie de la glande surrénale est due à une carence en 17 cétostéroïdes à un taux normal.

On ignore la cause réelle de ces malformations.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Lorsque les signes d'insuffisance surrénale dominent le tableau clinique, avec la menstruation, le diagnostic reposera sur l'existence de malformations génitales. Il sera assez aisé chez la fille, beaucoup plus difficile chez le garçon. Dans ce cas l'existence de cas identiques dans la fratrie, constitue un bon argument en faveur du diagnostic.

Il faudra éliminer une maladie des vomissements habituels ou une absence de priape. Avant que ne soit connue les modifications biologiques du syndrome de Laurence-Fabriger, le diagnostic était souvent fait. D'insuffisance surrénale reconnue, il faut éliminer une hypoplasie surrénale, qui donne une insuffisance surrénale isolée, une insuffisance surrénale fonctionnelle type Jaudon.

Lorsqu'il n'y a pas de signes d'insuffisance surrénale, le diagnostic est celui d'un virilisme ou d'une puberté précoce. Chez la fille, un signe clinique important en faveur de l'hyperplasie congénitale des surrénales, est la présence d'un sinus uro-génital, mais il n'a pas de valeur absolue. Chez le garçon, le diagnostic repose sur une macrogénéitosomie précoce dont le caractère particulier est l'existence de petits testicules et l'absence de spermatogénèse.

Nombreux sont les diagnostics différentiels à envisager. Ils sont exposés dans un article de Wilkins, de "Pediatrics" septembre 1955.

Chez la fille :

il faudra différencier les malformations génitales de type hermaphrodite,

- d'un hermaphrodisme vrai

caractérisé par la coexistence du tissu des deux sexes, des systèmes Wolfien et de Müller. On peut voir un testicule d'un côté, un ovaire de l'autre, ou les deux tissus de chaque côté formant, soit un organe commun : l'ovoteste le plus souvent en position abdominale, soit deux organes juxtaposés : ovaire et testicule. Extérieurement, l'aspect le plus fréquent est celui de l'hypospadias, mais on peut voir l'aspect du pseudo-hermaphrodisme féminin ou du pseudo-hermaphrodisme masculin suivant les cas.

Le taux des IV oöstéroïdes urinaires est toujours normal.

On pratiquera une biopsie de la peau, à la recherche de sexe

chromosomique et, si besoin est, une biopsie des glandes génitales après laparotomie exploratrice.

- du pseudo-hermaphrodisme masculin :

ces malades ont des gonades qui sont des testicules, ils peuvent être situés, soit à l'intérieur de l'abdomen à la même place que l'ovaire, soit dans le canal inguinal ou dans les plis labio-scrotaux. Les tubes sont développés, composés de cellules germinales différenciées, mais après la puberté, des cellules de Sertoli peuvent prédominer et de nombreuses cellules de Leydig sont souvent trouvées.

On peut les diviser en deux groupes :

Dans le premier groupe,

les organes génitaux externes sont masculins, le développement du phallus et des plis labio-scrotaux est variable. Parfois le phallus ressemble à un pénis bien développé avec hypospade. Les plis labio-scrotaux sont bien fusionnés, le méat urinaire est situé à la base du phallus. De tels malades sont pris pour des mâles cryptorchides avec hypospade jusqu'à ce que l'on ait examiné les organes génitaux internes.

Dans d'autres cas, le phallus est seulement modérément développé et les plis labio-scrotaux ne sont pas ou sont partiellement fusionnés, laissant entre eux un orifice semblable à un orifice vulvaire. Dans cette dernière, il y a habituellement un single orifice, parfois on peut voir un petit orifice adjacent. Pour voir s'il y a des structures féminines provenant des conduits de Muller, et pour déterminer l'étendue de leur développement, il faut un créthroscope ou une laparotomie exploratrice. Dans quelques cas, il y a un développement intense des organes féminins avec un vagin s'ouvrant dans un sinus uro-génital, un utérus et des trompes normalement formés. Anatomiquement, ces sujets sont comparables à une fille pseudo-hermaphrodite, ayant une hyperplasie congénitale des surrénales, excepté qu'ils ont des testicules au lieu d'ovaires.

Dans certains cas, l'utérus est moins développé, et une ou deux trompes de Fallopes manquent. Paradoxalement, le même pseudo-hermaphrodisme qui a une prédominance des organes génitaux féminins, peut à la puberté, développer les caractères mâles secondaires. D'autres, qui ont des organes génitaux ambiguës ou peu féminins, peuvent se développer indifféremment dans le sens masculin ou féminin. Chez ces individus, il y a un petit orifice vaginal, aveugle ou se communiquant avec le sinus uro-génital. Les canaux dérivés peuvent être bien développés et s'ouvrir dans l'urèthre postérieur.

Dans le deuxième groupe,

les organes génitaux externes simulent des organes génitaux féminins. Ils sont pris pour des filles. Les organes génitaux sont entièrement féminins : le clitoris n'est pas chassé, la vulve est normale, les canaux vaginaux et urinaux sont séparés, quelquefois il existe un sinus uro-génital communiquant avec une poche vaginale. Les testicules peuvent être dans les canaux inguinaux ou dans les replis labiaux, ou dans l'abdomen comme les ovaires. Quand il y a un vagin, il est de taille normale, mais se termine habituellement en cul de sac. Il n'y a ni col, ni utérus, il peut y avoir des canaux de Muller reliant

le vagin à un anus qui ressemble à l'utérus. Parfois, l'anus existe avec une ou deux bourses de Lilliput. Les testicules sont rudimentaires, les tubules sont composés de cellules de Sertoli isolées, des cellules de Leydig sont présentes. Habituellement, à la puberté, les testicules restent rudimentaires sans fonctionner. Les règles apparaissent, la puberté augmente, l'ovulation est normale. Les testicules ne sont pas différents de ceux de pseudo-hermaphrodites masculins avec organes masculins.

Les 17 céstéroïdes sont augmentés : 20 à 30 mg, les testicules sécrètent des androgènes à des taux normaux pour le sexe adulte.

- des autres pseudo-hermaphrodites féminins :

Ils ne sont pas obligatoirement liés à l'hyperplasie congénitale des surrénales. Ce sont des cas très rares. J'en ai été bien identifiés.

Le phallus est bien développé, peu différent d'un pénis hypoplasique. Les plis labio-péniaux fusionnés semblent un scrotum. Il y a un orifice pénien et un orifice urétral séparés et divergent dans le vagin. Les testicules ne sont pas palpables. Les malades sont souvent prises pour des filles hyperandrogènes. Le phallus génital est identique à celui des femelles pseudo-hermaphrodites par hyperplasie congénitale des surrénales. Il y a soit un vagin s'ouvrant dans le sinus uro-génital, soit un orifice vaginal séparé, utérus et trompes de Fallope sont normalement, les ovaires sont à leur position habituelle, mais contrairement au pseudo-hermaphrodisme de l'hyperplasie congénitale des surrénales, l'ovulation androgénique n'est pas accrue. Aucun développement androgène secondaire masculin ne se produit à la puberté. La puberté normale, les règles apparaissent, utérus, trompes et ovaires sont normaux, l'ovulation est possible.

Ces cas ont été provoqués par l'excès bilancé de la mère. On pense que ces malformations sont dues à l'excès du rapport testogène androgène à la phase régressive de la fusion urétrale qui se fait avec l'utérus, à la naissance humaine, c'est-à-dire que la différenciation sexuelle ne vienne renforcer la montée des testogènes maternels.

Le diagnostic différentiel avec le pseudo-hermaphrodisme masculin de l'hyperplasie congénitale des surrénales, se fait uniquement sur le dosage des 17 céstéroïdes et sur l'honogramme éventuellement.

Il faudra différencier le virilisme causé par l'hyperplasie congénitale des surrénales :

- d'un virilisme acquis.

Il est différent des syndromes cortico-surrénaux congénitaux, car, à la naissance, il n'y a aucune anomalie génitale. Puis, on remarque vers 2 ou 3 ans, l'apparition de la pilosité pubienne, l'opertropisme du clitoris, l'androgénisme de la croissance et de l'ossification.

Il peut être dû, soit à une hyperplasie des surrénales s'ouvrant au niveau de la naissance, soit à une hyperplasie post-pubertaire qui crée un virilisme masculin de la puberté à la puberté. Le phallus ne se développe pas, les règles s'appauvrissent.

Les 17 céstéroïdes sont élevés dans ces deux cas.

- du virilisme des tumeurs surrénaliennes.
- ou des adénomes basophiles hypophysaires.

Adénomes ou néoplasie surrénaliennes réalisent la plupart du temps, un virilisme accompagné d'autres signes, et que l'hyperandrogénisme cortico-surrénal est global. A la naissance, il est souvent difficile à différencier. Le signe le plus frappant, est l'hypertrophie du clitoris et souvent le développement d'un pénis. L'hyperandrogénisme est lié à l'excès de androgènes androgènes qu'il y a l'hyperandrogénisme, qui est très répandu et généralisé. Le sinus uro-génital est le plus souvent inexistant.

Les 17 céto-stéroïdes sont très augmentés, et nous l'avons vu, l'exploration qualitative des 17 céto-stéroïdes, est dans ce cas d'un grand intérêt diagnostique. Les androgènes glucocorticoïdes sont perturbés. Le trouble est profond par ailleurs et conduit à l'hyperandrogénisme profond de sur-stéroïdes, souvent des résultats très variables sur la croissance et l'ossification.

A la période pré-pubérale, d'autres signes apparaissent. Le syndrome de Cushing se constitue.

Il existe une importante obésité cortico-surrénalienne, de l'acromégalie, des vergetures, une hypertension artérielle, un diabète provoqué par l'augmentation des 17 céto-stéroïdes, une anémie, conséquence de l'hyperandrogénisme.

Qu'il soit d'origine surrénalienne, ou créé par un adénome hypophysaire basophile, le tableau peut être plus ou moins complet et pose des problèmes diagnostiques avec l'hyperplasie congénitale des surrénales.

- d'un virilisme par arrhénoblastome de l'ovaire.

D'une très grande rareté, ce diagnostic sera affirmé par la découverte d'une tumeur pelvienne et par la chromatographie des urines.

On ne pourra pas confondre, malgré l'androgénisme et l'accélération de la croissance, le virilisme, c'est-à-dire la fausse puberté précoce, et :

- la vraie puberté précoce,

essentielle ou cérébrale, qui réalise une féminisation complète avec développement de la poitrine, apparition des règles, possibilité de fécondité. Elle se caractérise par un volume normal et le taux des 17 céto-stéroïdes androgènes et des céto-stéroïdes est comparable à celui de la puberté.

Chez le garçon :

- il faudra différencier l'hyperplasie congénitale des surrénales
- de la pseudo-puberté précoce

par hyperplasie congénitale acquise, par tumeur surrénalienne, adénome ou néoplasie.

- de la vraie puberté précoce,

par lésions cérébrales, par tumeur testiculaire, par des testicules de volume adulte, une spermatogénèse normale ou à l'état de l'hyperandrogénisme, une excitation de la suite.

ANATOMIE PATHOLOGIE.

Elle fut l'objet d'études sérieuses lorsqu'on commença à diagnostiquer la maladie.

Dès 1905, Fibiger et, en 1925, Debré et Sémelaigne, notent l'hyperplasie congénitale la cortis surrénal. Les deux surrénales sont, en effet, volumineuses, parfois plus grosses et plus lourdes que le rein dont elles coiffent le pôle supérieur. Leur poids est très augmenté 10 à 35 gr au lieu de 5 à 8 gr.

Leur deuxième caractère essentiel, est leur aspect irrégulier, découpé par des sillons en dépressions limitant des zones saillantes, ce qui leur a valu le nom de cérébriforme.

L'étude histologique montre que seule la corticale est touchée par l'hyperplasie; la médullaire est normale, parfois réduite.

La coloration de l'hémalunéosine met en évidence une glomérulaire mince, peu différenciée, une fasciculée très hypertrophiée, avec des cellules à noyaux hyperchromatiques et dentelés, une réticulée dont les cellules chromo-lipoides ont un aspect nécrotique, une zone foetale très développée chargée de graisse. Par coloration à la fuchine, on trouve des grains fuschinophiles acides nombreux, surtout dans la zone foetale.

Pour d'autres, l'hyperplasie se fait le plus souvent au dépend de la zone réticulée dont le tissu est fait de cellules polyédriques à cytoplasme granuleux éosinophile avec vacuoles peu nombreuses contenant des grains fuschinophiles.

L'accord n'est pas encore réalisé sur le caractère foetal ou adulte du tissu hyperplasié. Mais il est unanimement reconnu que la glomérulaire est toujours atrophiée.

Il n'est pas prouvé que chaque couche ait une fonction hormonale définie, cependant on a été tenté d'établir un parallélisme entre les altérations histologiques et les troubles hormonaux.

Pour certains, l'atrophie constante de la glomérulaire en cas de troubles addisoniens, a fait penser que cette couche sécrétait les minéraux-corticoïdes. Pour confirmer cette hypothèse, nous avons vu, dans un cas rapporté par Hange et Carbeol, une glomérulaire hypertrophiée dans un cas sans insuffisance surrénale avec hypertension.

On a parfois pensé que les grains fuschinophiles sécrétaient les 17 cétostéroïdes en excès.

P A T H O G E N I E

Les problèmes pathogéniques se sont posés depuis que le syndrome a été reconnu. Comment expliquer cette dissociation des fonctions cortico-surrénales : l'hypofonction minérale-corticoïde, associée à un hyperfonctionnement androgénique ?

Il est intéressant de voir les hypothèses faites et comme elles se sont confirmées avec les progrès de la recherche scientifique.

On a d'abord évoqué une hyperplasie primitive avec insuffisance surrénale. Il y aurait compression de la glomérulée par une rétículo ou une fibroblast hyperplasie, ce qui expliquerait l'hyperandrogénisme et l'insuffisance minérale-corticoïde. Ceci est peu probable, parce que :
il y a d'énormes hyperplasies sans insuffisance
il n'est nullement démontré que les zones arbitrairement distinguées par l'histologie aient différentes fonctions.

On a pensé à une hyperplasie surrénale, secondaire à une stimulation accrue par l'A.C.T.H. hypophysaire. En effet, un taux d'A.C.T.H. élevé a été mis en évidence dans le sang. Cette augmentation de l'A.C.T.H. serait primitive ou secondaire à l'insuffisance surrénale.

Primitive, ceci est peu probable, à cause de l'association du syndrome d'hyper et hypo-activité. Le fonctionnement fonctionnel de l'A.C.T.H. est absolument hypothétique.

Secondaire à une insuffisance anatomique de la glomérulée, cette thèse paraît plus vraisemblable. La glomérulée est fréquemment aplasiée. L'insuffisance minérale-corticoïde déclencherait une hyper-sécrétion d'A.C.T.H. dans le but d'équilibrer les troubles humoraux. Cet A.C.T.H. en excès agirait sur la cortico-surrénale mal formée qui libérerait un excès de 17 céstéroïdes. Mais, on aurait parfois vu des glomérulées hyperplasiées avec syndrome d'insuffisance hydrominérale.

Comment expliquer alors l'action de la cortisone ? La D.O.C.A. et le sel devraient amplement suffire à corriger les troubles électrolytiques et à freiner l'A.C.T.H. Or, avant l'emploi de la cortisone, on corrigeait les troubles du métabolisme hydrominéral, mais non l'hyperandrogénisme. Et comme nous l'avons dit plus haut, rien ne prouve que la glomérulée secrète les hormones minérale-corticoïdes.

On a pensé à des troubles métaboliques liés à un défaut de cortisone. La cortisone corrige en effet, l'hyperandrogénisme, sans doute en freinant l'A.C.T.H. puisque le taux d'A.C.T.H. diminue dans le sang circulant.

Est-ce que la cortisone agit par son action sur le métabolisme hydro-salé ? Diverses expériences prouvent que si :

Wilkins a fait les essais thérapeutiques suivants :

Dans un premier temps, il essaie de corriger les troubles électrolytiques par le sel, ce qu'on ne peut pas faire. Il les aggrave, et la puissance reste élevée. Ceci est corrigé par l'administration de cortisone 15 mg par jour i.v. avec la prise d'eau de sel. Les crises d'insuffisance surrénale provoquées par la suppression du sel, sont enrayerées par la cortisone.

Jailer rapporte le cas d'un garçon de 2 ans 1/2,

qui avait besoin de 5 mg de D.O.C.A. par jour et 5 gr de sel. La suppression de la D.O.C.A. provoque des crises graves d'insuffisance surrénale corrigées par la cortisone.

Wilkins remarque que paradoxiquement, dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, l'administration d'A.C.T.H. pourrait produire une forte hyponatrémie au lieu d'une élévation par activation d'une sécrétion corticoidale. Il faut donc penser que l'A.C.T.H., dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, favorise la sécrétion d'une hormone "produisant la perte de sel". Ce stéroïde anormal serait trouvé dans la portion 17-hydroxycorticoides des stéroïdes urinaires. Simpson, en 1952, aurait isolé de surrénale anormale du sang, veineux de la surrénale, ce serait l'aldostérone. En outre fait confirmé par l'histologie : il faut pour corriger l'insuffisance minérale de l'hyperplasie congénitale des surrénales, des doses de D.O.C.A. élevées, cela pour l'expliquer par une leucémie d'addison.

On peut penser qu'il y a, dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, un défaut de cortisone qui entraîne un excès d'A.C.T.H., ce qui provoque la sécrétion d'une substance favorisant la perte de sel. Le défaut de cortisone est confirmé par l'expérience suivante :

une injection d'A.C.T.H. n'augmente pas le taux des 17-hydroxycorticoides dosés dans le sang circulant par la méthode de Porter et Silber.

C'est pourquoi, il n'est pas nécessaire de penser qu'il y a une insuffisance minérale-corticoidale et un excès de 17-cétostéroïdes. Pour certains auteurs, il y aurait une hyperplasie diffuse de la cortico-surrénale et un trouble métabolique empêchant la formation de cortisone. On pense que l'hormone de l'eau et du sel est l'aldostérone ou électro-cortine, 100 fois plus active que la D.O.C.A.. Elle tend à régler l'équilibre électrolytique des milieux extérieur et intérieur, en particulier elle donne du K à la cellule et du Na au plasma.

Cette hormone serait inhibée dans le syndrome de Debré-Fibiger par l'intermédiaire d'une substance anti-aldostérone, libérée par un excès d'A.C.T.H.. La cortisone en freinant l'A.C.T.H., rendrait à l'aldostérone ses fonctions. C'est pourquoi il semble possible d'équilibrer les troubles métaboliques du syndrome de Debré-Fibiger avec la seule cortisone.

Cependant, si le trouble métabolique essentiel est le


pour les cortisone, peuvent expliquer que les troubles de la glycémie ne soient pas plus importants ? Ils existent pourtant. Wilkins signale un cas de diabète hypoadrénergique. On note parfois un étallement de la courbe d'hyperglycémie provoquée, une sensibilité accrue à l'insuline. L'injection d'A.C.T.H. ne modifie ni le taux des hormones glucido-protidique, ni la glycémie.

Quel est le trouble métabolique essentiel qui est à la base de la mauvaise production de cortisone ?

Ceci semble lié, d'après Jailer et Bongiovani, à un défaut enzymatique congénital d'hydroxylation de ce stéroïde. Cette explication est récemment rapportée dans "the journal of clinical investigation" d'août 1955.

A l'état normal, le composé F est synthétisé par la corticostéroïde à partir du cholestérol sous l'influence de l'A.C.T.H. En effet, par des perfusions de surrénales a montré que le cholestérol était transformé en Δ^5 prégnénolone, puis en progestérone, puis en 17 hydroxyprogestérone, et enfin par une hydroxylation, en 21 et en 11, en composé F.

Ces différentes hydroxylation s'effectuent grâce à des enzymes dont l'existence a été démontrée in-vitro, mais n'ont pu encore être isolés et purifiés.



Dans le syndrome cortico-surrénal congénital, il existe un déficit du composé F. D'ailleurs, à côté de cet effet, une autre anomalie des 17 cortico-stéroïdes est observée. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17.


La voie de la 17 est bien une voie de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17.

L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17.

Ils jouent un rôle dans la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17. L'hydrocortisone de Porter et Hilder est bien un stéroïde des voies de l'axe de la 17.

Ainsi, l'une réagit que sur les 21 hydroxycortico-stéroïdes et son absence expliquerait le déficit d'hydrocortisone, malgré un taux normal de 17 hydroxy-cortisone. L'autre agit sur les 17 métyl-cortisone et donnerait des métabolites 17 hydroxy 17 métyl cortisone.

L'étude présente ne permet pas de tout expliquer par une absence de 17 hydroxylase ou de 21 hydroxylase. La trousse du métabolisme est plus compliquée et implique les enzymes et leurs co-facteurs.



L'hyperandrogénie serait causée d'une part, par la déviation du métabolisme du composé F, la 17 hydroxyprogestérone et ses dérivés, le prégnandiol ayant certainement une action androgénique; d'autre part par l'augmentation de l'androstérone provoquée par une hypersecrétion d'A.C.T.H.. La cortisone freine les androgènes et permet l'action des gonade-stimulines hypophysaires inhibées par l'excès d'hormones sexuelles surrénaliennes.

Cette explication est très satisfaisante, puisqu'elle permet de trouver une cause commune à deux syndrômes apparemment éloignés comme le sont un virilisme et une insuffisance surrénale aiguë.

T R A I T E M E N T

De bons résultats peuvent être espérés grâce à un traitement bien conduit. Ceci nécessite des examens de laboratoire constants et ne peut être effectué qu'en milieu hospitalier.

Dans les formes avec insuffisance surrénale, le traitement a deux buts :

corriger l'équilibre électrolytique
freiner l'hyperandrogénisme.

L'utilisation de la cortisone par Wilkins a fait faire un immense progrès à la thérapeutique. Lors plusieurs observations, Wilkins étudia l'action de la cortisone, de la corticostérone, du sel et de la désoxycorticostérone sur l'équilibre hydro-minéral et le taux des I7 céstéroïdes. Nous rapporterons ici en détail l'une de ses observations, car elle met avec évidence, les problèmes cliniques et thérapeutiques que pose le traitement hormonal de l'hyperplasie congénitale des surrénales.

Il s'agit d'une petite fille de 7 semaines, pseudo-bo-symphroïte, admise à l'hôpital pour des symptômes d'insuffisance surrénale aiguë : vomissements, déshydratation, collapsus. L'ionogramme est perturbé

Na : 130 mEq/l

K : 5 mEq/l

On traite la malade 18 mois.

Dans un premier temps, on observe l'action du sel. La malade reçoit uniquement du sel à raison de 125 mEq/l par jour, par voie parentérale puis buccale, au même temps quelle est réhydratée. Son état s'améliore, mais le taux anormal des électrolytes du serum n'est pas corrigé et l'excrétion urinaire de I7 céstéroïdes reste élevée aux environs de 3,5 mg par jour.

Ensuite, on donne de la cortisone, 25 mg par jour I.M., avec la même dose de sel. On constate une amélioration de l'état général, une prise de poids, le Na s'élève, le K baisse. 4 jours après le début du traitement, l'excrétion des I7 céstéroïdes urinaires descend à 0,80 mg et se stabilise à 0,44 mg.

A ce moment, on supprime tout le sel, tandis que la cortisone est continuée à la même dose. Bien que le malade ne montre aucun symptôme fâcheux, il y a une grande fluctuation du poids. L'effet de la dose excessive de cortisone se manifeste par : arthralgies, hypertension, faciès en pleine lune, la croissance et le développement osseux sont inhibés, la musculature devient hypotonique. Le sodium plasmatique diminue, le K

s'élève, les 17 céstostéroïdes demeurent identiques.

Dans une quatrième période on ramène la dose de cortisone de 15 à 5 mg par jour sans ajouter de sel. On observe : vomissements, anorexie, perte de poids, chute du Na à 129 mEq/l et élévation du K à 5,5 mEq/l, une élévation passagère du taux des 17 céstostéroïdes, mais elle cesse bientôt sans modification de la dose de cortisone.

On supprime le sel. Vomissements, perte de poids surviennent. Cependant les troubles métaboliques sont moindres qu'on pouvait le penser à cause de la grande quantité de sel donnée auparavant.

Il fut difficile de trouver la dose de cortisone suffisante pour contrôler l'hyperandrogénisme sans provoquer de rétention des hormones hydro-minérales. L'équilibre se fit avec les doses suivantes :

cortisone I.M. 5 mg/jour
Sel 100 à 110 mEq/l par jour.

Lorsqu'on remplace la cortisone I.M. par la cortisone orale, on n'observe aucun changement dans le métabolisme du patient.

On supprime la cortisone en donnant la même quantité de sel. Le Na baisse, le K reste stationnaire, les 17 céstostéroïdes augmentent rapidement.

Lorsqu'on reprend la cortisone, on constate que le Na s'élève et que les 17 céstostéroïdes diminuent rapidement.

On peut conclure d'après ces essais thérapeutiques que la cortisone, outre son action anti-androgénique, a une action certaine sur le métabolisme hydro-minéral.

Dans une autre période, on essaie l'action de la corticostérone.

La corticostérone, ou compound B, mise à la place de la cortisone, produit une chute du Na et une élévation du K et des 17 céstostéroïdes.

On donne de la corticostérone I.M., 12,5 mg par jour et du sel à la même dose que précédemment. L'état clinique est bon, l'ionogramme satisfaisant; les 17 céstostéroïdes s'élèvent un peu : 1,3 mg par jour.

On supprime le sel en gardant la même dose de corticostérone. On n'observe aucune modification des électrolytes et des 17 céstostéroïdes.

On augmente la cortisone à 25 mg par jour I.M., pour voir s'il est possible d'obtenir une baisse des 17 céstostéroïdes. Le poids s'accroît rapidement, sans qu'il y ait modification de l'ionogramme; les 17 céstostéroïdes baissent à 0,9 mg par jour. Il n'y a pas assez de corticostérone pour poursuivre le traitement. Donc la corticostérone à fortes doses modifie les 17 céstostéroïdes.

On reprend le traitement à la corticostérone, en abaissant les doses journalières à 9 mg, tandis que la malade garde le même régime. On note des signes annonciateurs de l'insuffisance surrénale. Le Na baisse à 130 mEq/l et le K s'élève à 5,8 mEq/l.

La cortisostérone est ensuite arrêtée sans que soit modifiée la prise de sel. On observe de fortes perturbations électrolytiques, de l'hypernatrémie, de l'hyperosmolarité, une altération clinique importante, une augmentation des 17 céstéroïdes des à 6,3 mg par jour.

On essaie ensuite l'action de la D.O.C.A. Le malade est maintenu à l'équilibre avec le traitement suivant :

cortisone : 12 mg par jour

On ajoute alors de la D.O.C.A. 1 mg par jour en I.M. Il n'y a pas de modification de l'équilibre électrolytique.

On augmente alors la dose de la D.O.C.A. à 2 mg par jour, maintient à l'équilibre électrolytique. On observe une persistance de l'hypernatrémie, une augmentation des 17 céstéroïdes, on souligne donc l'importance du sel.

On donne alors D.O.C.A. 2 mg par jour I.M. et cortisone 12 mg par jour, I.M., ClNa en quantité importante. On observe une amélioration de l'équilibre, on se charge d'augmenter la cortisone pour obtenir un bon résultat sur les 17 céstéroïdes.

On baisse alors la cortisone; on la donne par voie orale à raison de 25 mg par jour avec de la D.O.C.A. 2 mg par jour et les doses de sel. Des troubles surviennent, qu'on pense dus à une insuffisance.

Enfin, le 520^{ème} jour du traitement, on implante 4 pellets de 250 mg de D.O.C.A. dans la région sous-occipitale. Les injections I.M. de D.O.C.A. 25 mg tous les 3 jours et les mêmes doses de sel sont continuées. Les troubles électrolytiques sont corrigés de façon durable et l'appareil fonctionne.

Il s'agit d'un enfant âgé de 21 mois, qui mesure 74 cm, pèse 3,5 kg, possède un âge osseux entre 1 et 2 ans. son traitement est le suivant :

ClNa : 4 g

Cortisone : 25 mg tous les 3 jours en I.M.

Dans autres observations faites par Wilkins, dans les mêmes conditions, on arrive à conclure à l'action anti-antagonisme de la cortisone à petites doses et à l'effet des effets sur les désordres électrolytiques. L'eau que l'avons vu, elle augmente la rétention de sel.

Il paraît que la cortisone agit sur la rétention de l'eau et de l'électrolyte que la cortisone, en même temps, agit sur l'équilibre électrolytique.

Dans les conclusions de Wilkins sur la manière de conduire le traitement (paru dans un article de "pediatrics" de Mars 1956).

On voit que le malade arrive en état d'insuffisance surrénale.

aigue, il faut corriger les troubles électrolytiques par du sel à fortes doses, 4 à 8 gr par jour par voie orale ou parentérale, en se basant sur les résultats hépatiques et sur l'excrétion urinaire. Mais cela ne suffit pas à maintenir l'équilibre électrolytique surtout en cas d'infection.

Après que les manifestations cliniques de désordres électrolytiques ont été corrigés, on détermine la dose minimum de cortisone nécessaire pour étouffer l'hyperandrogénisme. On se base sur le taux des 17 oestrogénides. Les hautes doses de sel sont poursuivies.

On conseille, pour avoir un effet rapide, de donner 25 mg de cortisone I.M. par jour pendant 5 à 10 jours. On se base également pour déterminer les doses sur le développement tumoral et osseux. Un excès de cortisone entraîne un retard de l'oséum et une inhibition de la croissance.

Le traitement d'entretien utilisera, soit la cortisone I.M. en espaçant les piqûres, soit la cortisone orale dont les doses journalières prises en 3 ou 4 fois seront plus fortes.

La cortisone seule avec du sel est-elle capable d'assurer l'équilibre électrolytique ? D'après Wilkins, ce serait possible chez quelques enfants. Cependant la D.O.C.A. est recommandée. Son plus grand avantage est de permettre de réduire les doses de sel chez un malade surrénalien.

Il faut calculer la dose de D.O.C.A. nécessaire avec une dose de sel et une dose de cortisone à maintenir. Un mois est nécessaire pour établir cet équilibre. Généralement on donne 2 à 4 mg de D.O.C.A. I.V. par jour avec 2 à 3 gr de sel.

Une fois la dose de D.O.C.A. connue, on cherche le nombre de pellets à faire. Chaque pellet correspond à 0,5 mg de dose journalière. Il contient 125 mg de D.O.C.A. On conseille de faire les 2/3 de la dose ainsi calculée. On réduit le sel à 1 et 2 gr. L'effet des implants peut se faire sentir plusieurs années.

Le syndrome d'adénosarcome produit des troubles métaboliques. Dans ce cas, Wilkins recommande de donner du sel et de ne pas augmenter la cortisone.

Pour Wilkins, il semble préférable de réduire le syndrome électrolytique par sel et cortisone d'abord et de fixer les doses de D.O.C.A. ensuite.

La raison en est qu'il faut moins de D.O.C.A. et de sel quand l'activité surrénalienne a été inhibée par la cortisone. Si au contraire, le syndrome électrolytique est d'abord corrigé par D.O.C.A. et sel, on réapparaît un excès de sel qui doit être corrigé après l'administration de cortisone, sinon une réaction de sel excessive de grave conséquence peut en résulter.

Cependant, certains auteurs craignant que le sel ne soit insuffisant, préfèrent passer immédiatement au traitement de l'insuffisance surrénale aigüe et donner de la D.O.C.A.

Il n'existe que des cas particuliers qui nécessitent, suivant les résultats du laboratoire, une adaptation du traitement type.

Pour résumer, donnant cependant quelques doses :

est donné d'urgence sous forme de serum physiologique, en I.V. ou sous-cutané, et ensuite par voie buccale. La dose est de 2 à 4 gr par jour; elle peut atteindre 5 à 6 gr

La cortisone :

est la plus souvent donnée aux doses suivantes :

- chez le nourrisson, il faut que le taux des 17 céstéroïdes soit inférieur à 0,1 mg, mais les résultats sont difficiles à obtenir à cause de l'excrétion des métabolites.

On donnera comme traitement initial :

cortisone I.M. : 25 à 50 mg par jour,
pendant 3 à 10 jours.

Comme traitement d'entretien :

cortisone I.M. : 25 mg tous les 3 jours, ou
cortisone orale : 12 à 15 mg par jour en
3 ou 4 fois, car elle est moins efficace et
d'une absorption plus lente.

chez l'enfant plus âgé, de plus de 3 ans, le taux des 17
céstéroïdes est souvent voisin de 1 mg, il est donc
difficile de l'obtenir plus bas.

Les doses d'attaque seront :

cortisone I.M. : 25 à 50 mg par jour

Les doses d'entretien seront :

cortisone I.M. : 75 mg tous les 3 jours ou
100 mg tous les 4 jours

cortisone orale : 20 à 75 mg par jour en 2 à 4 fois.

Des essais thérapeutiques ont été faits avec :

- la tétrahydrocortisone : ils n'ont donné aucun résultat,
le taux des 17 céstéroïdes n'est pas abaissé.

- L'acétate d'hydrocortisone : son intérêt est de permettre d'espacer les piqûres I.M.. On en fait une tous les 10 à 15 jours, toutes les 3 semaines parfois. La vitesse d'absorption est très lente, mais il faut qu'il y ait à chaque instant dans le sang, la dose nécessaire de ce produit pour s'opposer à l'action de l'ACTH. C'est pourquoi, les doses doivent être considérables, de 250 à 500 mg par injection.

L'effet thérapeutique est bon. Les 17 céstéroïdes diminuent ainsi que le prégonadotrophine.

L'intérêt pratique est grand puisque le traitement est plus efficace par voie I.M. et doit être poursuivi longtemps.

La D.O.C.A. :

si on la donne dès le début des accidents d'insuffisance surrénale aigüe, on peut être amené à faire des doses assez considérables : on commence par 2 mg par jour, on augmente de 1 mg tous les jours, jusqu'à ce que le K soit inférieur à 6 mEq/l; on donne 5 à 6 mg par jour chez le nourrisson. Les doses doivent être réduites progressivement par petites doses, au moins à 1 mg par jour et après l'implant.

En fait de plusieurs mois, le patient étant équilibré, on peut mettre des pellets. Nous avons vu la règle de Wilkins pour calculer la dose des implants. Dans un article de la "presse médicale" de Mars 1964, Monsieur Debré arrive à des conclusions assez différentes: pour lui un implant équivalent à 2 mg de dose journalière de D.O.C.A..

L'aldostérone :

traitement rapporté par Mason dans "the lancet" en sept. 54

Son emploi n'est pas courant, mais des essais thérapeutiques ont donné des résultats satisfaisants. Dans le cas de pseudo-phéochromocytome féminin on donna :

500 µg par jour pendant 4 jours	
1050 µg	5ème et 6ème jour
750 µg	7ème jour.
avec 115 mEq/l de sel par jour.	

On constate une rétention de Na et de Cl importante, plus importante qu'avec la cortisone.

Le Na augmente de 144 à 153 mEq/l

Le taux du K fut abaissé

La T.A. ne fut pas modifiée

Les troubles de la glycémie furent corrigés

Les éosinophiles ne furent pas touchés

Le taux des 17 céstéroïdes urinaires augmenta de 89 à 120 mEq/l.

On en conclut donc que l'aldostérone n'a aucune action sur le métabolisme hydro-minéral et carboné en faisant une hormone très complète.

Résultats du traitement :

les résultats sont bons :

- en cas d'insuffisance surrénale.

Iverson rapporte dans "pédiatrie" de Décembre 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826,

journal clinical of endocrinology" de Mars 1952.

Chez la fille traitée pendant 5 à 17 mois, dans la période prépubertaire, on observe un développement rapide de la poitrine, une oostrogénisation des frottis vaginaux, une diminution de l'hirsutisme, une apparition des règles.


Chez le garçon, on obtient une augmentation rapide des testicules avec acrospermatogonies, et une apparition des cellules de Leydig, tandis que l'âge osseux se développe peu.

La raison de cette maturation sexuelle est, nous l'avons vu, la libération par la cortisone des gonadotrophiques hypophysaires, inhibés par les androgènes et oestrogènes en excès qui provoquent une vraie puberté quand les individus ont atteint le développement somatique voulu.

Voici le schéma explicatif de Wilkins:

Non traité :

traité par la cortisone :



Envisageons les résultats du traitement sur la croissance et l'âge osseux, exposé par Wilkins dans un article de "Pédiatrie" de Mars 56.

Lorsque le traitement est commencé chez des enfants ayant moins de 2 ans :

il y a généralement une petite accélération de la croissance et du développement osseux, mais l'âge osseux est inférieur à 6 ans. Les poils pubiens n'apparaissent pas avant 18 mois à 3 ans. Donc, le traitement permet aux enfants un développement normal, s'il est commencé suffisamment tôt.

Entre 2 et 6 ans :

les enfants ont généralement un âge osseux bien supérieur à leur âge. Les poils pubiens existent, mais la virilisation est modérée. L'âge osseux est parfois de 12 ans, mais il n'y a pas de fusion épiphysaire. Le traitement empêche un virilisme accentué et permet la prolongation de la croissance. Le développement sexuel se fait normalement dans le sens réel.

Chez les malades ayant entre 7 et 20 ans :

L'âge osseux est celui d'un

adulte: la fusion épiphysaire existe parfois et empêche toute croissance

différence. Si ce n'est, peut-être un handicap considérable chez la femme, de même que les excroissances surviennent sur un territoire hypertrophié. C'est le traitement pour faire régresser le vieillisme et provoquer des règles, lorsque l'âge osseux est entre 12 et 14 ans.

De même, chez les garçons ayant atteint l'âge osseux voulu, le traitement produit une véritable puberté.

Traitement chirurgical.

Il ne doit pas, pourtant, être systématiquement délaissé. Il doit s'efforcer de parfaire les organes génitaux externes dans le sens féminin. Si le clitoris est augmenté de volume, il pourra être modifié avant l'âge scolaire et le sinus uro-génital, corrigé, pour former un orifice vaginal séparé.

Donc une enfant pseudo-homosexuelle, devra être traitée par la cortisone et élevée comme une fille le plus tôt possible, car l'éducation sexuelle dépend souvent de l'éducation.

Pour Wilkins, dans le choix du traitement, il faut tenir compte de l'âge et de l'éducation qu'a reçu l'enfant. S'il a été élevé en garçon, étant fille, il faut continuer, dans ce cas, la cortisone, pour permettre un développement du squelette normal, et faire une posthystérectomie pour éviter la fécondation. On donnera au garçon de la cortisone pour favoriser la maturation du squelette, et pour favoriser la fertilité.

CONCLUSION.

Quatre observations sont présentées, qui montrent le progrès immense, accompli dans la connaissance et la thérapeutique du syndrome de Dabre-Finzi, et.

Le diagnostic clinique a été fait :

- sur la constatation de manifestations cliniques, chez des enfants atteints de colléreuse, déshydratation, vomissements, dans deux cas de pseudo-hermaphrodisme féminin.

- sur la découverte de cas familiaux identiques, dans deux cas masculins de syndrome de Dabre-Finzi.

- sur l'efficacité de la thérapeutique dans un quatrième cas, qui pose de nombreux problèmes étiologiques.

Malgré tous les examens biologiques, le diagnostic ne pourrait être fait.

L'examen essentiel est le dosage des 17 cétostéroïdes urinaires. Leur étude qualitative apporte de précieux renseignements, en particulier le dosage des 3^{es} cétoand-17^{es} ou H.B.A., et du prégnandiol ou prégnandriol, qui sont augmentés.

Les diagrammes sanguins et urinaires affirment l'existence de l'insuffisance surrénale, et permettent d'en suivre la régression sous l'influence de la thérapeutique.

Des théories pathogéniques nombreuses ont été faites. Actuellement, on voit que le trouble essentiel est un défaut de fabrication de cortisone lié à un trouble enzymatique, qui entraîne une hypersecretion d'A.C.T.H. C'est A.C.T.H. hyperplasie la surrénale, qui répond par un excès normal global. Les 17 cétoand-17^{es} sont augmentés. Une hormone anti-aldostérone est excrétée. Elle inhibe les hormones surrénaliennes, l'aldostérone en particulier, et l'insuffisance surrénale.

La cortisone réduit la teneur des 17 cétoand-17^{es} en traitant l'A.C.T.H. et libère de leur stimulation les hormones surrénaliennes. On diminue l'excès anti-aldostérone par le même traitement.

La cortisone est la thérapeutique de base de l'hyperplasie surrénale. On discute de la nécessité de la D.O.C.A. avec insuffisance surrénale. L'accord est fait. La thérapeutique par la

seule cortisone échoue. Il faut donner :

ClNa
cortisone
Puis D.O.%.A.

et, une fois le malade équilibré, instituer un traitement d'entretien de longue haleine qui donne généralement d'excellents résultats.

L'étude de ce syndrome, permet de voir les étapes suivies par la science médicale en peu d'années.

L'esprit d'observation du clinicien, a permis d'isoler la maladie, d'en faire le diagnostic. L'histologie la fit mieux connaître. Actuellement, c'est surtout dans le domaine de la chimie biologique, que se font les progrès. Une connaissance approfondie de la physiologie de la surrénale et du métabolisme de ses hormones en résulte.

Le trouble métabolique primordial qui engendre deux tableaux cliniques aussi différents qu'un vieillissement et une insuffisance surrénale, est sur le point d'être trouvé.

Le but de la médecine, diagnostiquer, expliquer, traiter et guérir, est ici réalisé, puisque le traitement permet de sauver des nourrissons qui mourraient autrefois en bas âge, et de rendre à une vie sociale normale des individus misérables.

Vu et permis d'imprimer

LE RECTEUR
DE L'ACADEMIE DE PARIS

J. SARRAILH

VU LE DOYEN DE LA
FACULTE DE MEDECINE
DE PARIS.

L. BINET

VU : LE PRESIDENT DE THESE

Monsieur le Professeur DEBRE.

BERNHHEIM, M (et al.)..... Syndrome de Debré-Mibiger observé à la phase terminale. Importance de l'hyperkaliémie, des troubles cardiaques et des lésions de myocardiopathie parenchymateuse.

PEDIATRIE, Lyon
1954, 9, N°4
pp. 361-369 illus.

BERNHHEIM, M. (et al.)..... Les syndromes d'hyperfonctionnement surrénal d'origine tumorale chez l'enfant.

LA SEMAINE DES HOPITAUX DE PARIS
1954, 30è ann.n° 41, 25 Juin
pp. 2597-2605 illus., diagn.

adrenogenital syndrome.

ACTA ENDOCRINOLOGICA, Copenhagen
1955, 18, fasc. 4
Bibliog. pp. 519-520
pp. 512-520 illus., tabl., diagn.

BONGIOVANNI, Alfred M.; EBERLEIN, Walter et CARA, José.

Studies on the metabolism of adrenal steroids in the adrenogenital syndrome

THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, San-Francisco
1954, 14, N°4, April
pp. 409-422 tabl., diagn.
References pp. 421-422

Thèse, Lyon, Faculté de Médecine,
1952

CRIGLER, John F.; SILVERMAN, Samuel H. ; et WILKINS, Lawson.

Further studies on the treatment of congenital adrenal hyperplasia with cortisone.

PEDIATRICS
1952, 10, N°4, October
pp. 397-413 diagn.
References pp. 412-413

DEBRE, Robert (et al.)..... Hyperplasie congénitale des surrénales avec manifestation

PRESSE MEDICALE, Paris, 1954, 62, N°86. 25-10
pp. 1767-1770 illus., tabl., diagn.
Bibliog. p. 1770

congénitales.

LA PRESSE MEDICALE, Paris
1953, 61, N°17, 4 Mars
pp. 310-312 tabl.
Bibliog. p. 312

DEBART, Jacques et JAYLE, Max F..... Effets de la perfusion I.V. de
corticostimuline (A.C.T.H.) sur
dans un cas d'hyperplasie surrénale
congénitale.

ANNALES D'ENDOCRINOLOGIE, Paris
1954, 15, N°5
pp. 797-802
Bibliog. p. 802

DEBART, Jacques (et al.)..... Effets de la cortisone dans 3 cas
de virilisme d'origine cortico-
surrénale.

ANNALES D'ENDOCRINOLOGIE, Paris
1952, 13, N°6
pp. 959-966 tabl.
Bibliog. p. 966

DEBART, Jacques (et al.)..... Aspects cliniques et biologiques
du virilisme chez la femme.

LA VIE MEDICALE, Paris
1954, Mai, N° spécial
pp. 12-16 illus., diagn.

DEBART, Jacques et JAYLE, Max F..... Effets comparés de la roxygenthé-
rapie, des oestrogènes et de la
cortisone.

BULLETINS ET MEMOIRES DE LA SOCIETE
MEDICALE DES HOPITAUX DE PARIS.
1953, 69, N°30-31, Séance du 27, II
pp. 98-996 tabl., diagn.
Bibliogr. p. 996.

ACTA PAEDIATRICA BELGICA

pp. 169-182

DEBART, Jacques et JAYLE, Max F..... pathological increases in adrenal
cortical function on urinar
alphaketolic steroid metabolites:
THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION,

1955, 34, N°3, March
pp. 485-489, Tabl., diagr.
Bibliog. pp. 497-499

..... Serial determination of urinary
adreno-cortical steroids in adrenal
hyperplasia.
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, New York
1955, 34, 8 August
pp. 1337-1343

GUILLEMINET, M.; et BONNET, J..... Pseudo-hermaphroditisme. Masculinisation
et hyperfonctionnement surrénal.
PEDIATRIE, Lyon
1953, 8, N°3
pp. 451-454

GROEN, A.; VRIES, J.A. et WIED, D. Primary excretion of 17-ketosteroids
in patients with adrenocortical syndrome
ACTA ENDOCRINOLOGICA, Copenhagen
1955, 18, fasc. 4
pp. 530-535 diagr.
References p. 535

..... adrenogenital syndrome with special
reference to steroid excretion
during continued and discontinued
therapy
ACTA ENDOCRINOLOGICA, Copenhagen
1955, 19, fasc. 2
pp. 101-111 diagr.
References pp. 110-111

..... Treatment of the adrenogenital
syndrome with cortisone
THE LANCET
N° 6732, vol. CCLXIII, Sept. 6 1952
pp. 464-465 illus. tabl. -
References p. 465

..... Etude biochimique d'un cas de
pseudo-hermaphroditisme avec
coexistence de troubles du
métabolisme minéral et du
métabolisme hydrocarboné.
ANNALES D'ENDOCRINOLOGIE, Paris
1954, 15, N°6
pp. 924-933 illus. tabl. radio, diagr.
Bibliogr. pp. 932-933

IVERSEN..... Hyperplasie congénitale des
surrénales avec troubles de la
régulation électrolytique ou
dysadrénocorticisme.
PEDIATRICS 1955 Décembre.

FAILER, Joseph W. "cortisone test" as a diagnostic
aid in differentiating adrenal
hyperplasia from adrenal neoplasia
THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE, New York
1954, 16, N°3, march
pp. 340-345 tabl. diagn.
References pp. 344-345

FAILER, Joseph W. Virilism
BULLETIN OF THE NEW YORK ACADEMY OF
MEDICINE
1953, 29, N°5 May
pp. 377-394 tabl. diagn.
References pp. 393-394

FAILLER, Joseph W.; ROBINSON, Jean L.; CHILLI, George E. ARRESTED VIRILISM
II. Metabolic studies.
THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION
Vol. XXXI, N°10, October 1952
pp. 880-884 diagn.

FAILLER, Joseph W.; ROBINSON, Jean L.; CHILLI, George E. ARRESTED VIRILISM
I. Clinical and laboratory studies.
congénitaux. L'hyperplasie
surrénale congénitale.
PEDIATRIE, Lyon
1953, 8, N°3
pp. 307-355 illus.
Bibliogr. pp. 353-355

FAILLER, Joseph W.; ROBINSON, Jean L.; CHILLI, George E. ARRESTED VIRILISM
III. Pathogenesis and treatment.
La pédiatrie en 1952. Endocrinologie,
manifestations cliniques de
l'hyperplasie surrénale congénitale
chez le nourrisson.
LA REVUE DU PRATICIEN
Tome II, N°27, 21 Octobre 1952
pp. 1773-74
Bibliog. p. 1774

FAILLER, Joseph W.; ROBINSON, Jean L.; CHILLI, George E. ARRESTED VIRILISM
IV. Follow-up study.
La diagnostic clinique et biologique
de l'hyperfonctionnement
androgénique de la cortico-
surrénale chez l'enfant (A propos
de 3 observations).
LA SEMAINE DES HOPITAUX DE L'ENFANT
Année 1953

1955, 51e ann., N° 19/2, 22 Mars
Bibliog. p. 1090/86; p. 1033. p. 1090

LELONG Marcel..... Pubertés précoces et virilisme
précoce chez les enfants des
deux sexes.

LA SEMAINE DES HOPITAUX DE PARIS
1954, 30ème ann., N°2, 6 Janvier
pp. 79-92 illus., tabl., diagr.
References p. 92

LEVEQUE Bernard..... Les hyperplasies congénitales des
surrénales.

GAZETTE MEDICALE DE FRANCE
25 Février 1956

LEVEQUE Bernard..... Syndrome d'hyperplasie congénitale
des surrénales (Debré-Fibiger)

JOURNEES PEDIATRIQUES, 1954

MARIE, Julien..... Le syndrome de Debré-Fibiger
CLINIQUE MEDICALE DES ENFANTS 1952
pp. 185-190

MARIE, Julien (et al.)..... Le syndrome d'hyperplasie cérébri-
forme des surrénales de la période
néonatale (syndrome de Debré-Fibiger)

ARCHIVES FRANCAISES DE PEDIATRIE
Tome IX, N°8, 1952
pp. 785-817 tabl.
Bibliog. pp. 812-813

MARIE, Julien..... a metabolic study.

THE LANCET
N° 6751, January, 1955
pp. 116-118 diagr.
References p. 118

PHILIPP, E et STANGE, H.H..... Ein Fall von adreno-genitalem syndrom
mit grossen polycystischen Ovarien und
partieller Atresie der Scheide.

ACTA ENDOCRINOLOGICA, Copenhagen
1954, 17, fasc. 1-4, Sept. December
Résumé en Anglais
Schrifttum pp. 353-354

tismus masculinus bei kongenitaler
nebennierenrinden-hyperplasie ohne
adrenogenitale androgenüberproduktion (adrenogenitaler

HELVETICA PAEDIATRICA ACTA, Basel
1955, 10 fasc. 4, August
pp. 397-412 illus. tabl., graph
Bibliog. p. 412. Résumés en français.

phroditismus femininus des kingenitalen adrenogenitalen syndroms.
Morphologie häufigkeit, enswicklung und vererbung der verschiedenen genitalformen.

HELVETICA PAEDIATRICA ACTA, Basel
1954, 9, fasc. 3, Juli
pp. 231-248 illus., tabl.
Bibliog. p. 248. Résumés en allemand, français italien et anglais.

disease and adrenal pseudohermaphroditism.

THE LANCET, London
1954, 6839, 25 Sept.
pp. 620-624 tabl., diag.
References p. 624

surrénales de la période néo-natale.
Syndrome de Debré-Fibiger.

LA VIE MEDICALE, Paris
1954, 35ème ann., N°6, Juin.
pp. 571-575 illus.

virilizing adrenal hyperplasia with hydrocortisone acetate, successful therapy with infrequent intramuscular injections.

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, Chicago
1955, 157, N°17, 23 April
pp. 1479-1481 tabl., graph.
Bibliogr.

diagnosis, selection of sex and treatment.

1955, 16, N°3, Sept.
pp. 287-302 illus., tabl.
Bibliogr. pp. 299-300

WILKINS, Lawson et CARA, José..... Further studies on the treatment
of congenital adrenal hyperplasia
with cortisone. V. Effects of cortisone
therapy on testicular development.
THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY
AND METABOLISM Springfield.
1954. 14. NO 3
pp. 287-290 illus
References p. 296

WILKINS, Lawson (et al.).....

WILKINS, Lawson..... The
XX, /385/ p. 17
25cm.

WILKINS, Lawson.....

WILKINS, Lawson.....

le diagnostic et
le traitement des syndromes virilisants
LA REVUE DU PRATICIEN SUPPLEMENT, Paris
1953. 6e ann., N°4,
p. 123-124

ZONDEK, Bernhard et FINKELSTEIN, Michel... Quantitative estimation of 3a,
17,20a-pregnenetriol -II-one in
urine as an aid in the diagnosis
of pseudhermaphroditic conditions.
ACTA ENDOCRINOLOGICA, Copenhagen
1954, 17, fasc. 4, Sept-December
pp. 452-459 tabl.
References pp. 458-459

ZUBLIN, W. Zur psychiatrie des adrenogenitalen
syndroms bei kongenitaler neben-
niere-rinden-rinden - hyperplasie
HELVETICA PAEDIATRICA ACTA, Basel
1952, 8, N°2, Mai
pp. 117-135
Bibliogr. pp. 134-135

